亲近大自然系列

常见中草药野外识别图鉴

车晋滇　编著

■ 野生中草药无污染，品质高，药性好。

■ 本书集我国常见主要中草药210种

各部位实景
鉴别。

化学工业出版社

中医药历经几千年不断发展完善，
形成了中国独特的传统中医药文化。

野生中草药无工业化污染，
绿色安全，品质高，药性好，取材方便。

充分利用野生中草药资源，可以防治疾病，保健强身。

农村开发利用野生中草药资源前景广阔。

本书集我国常见主要中草药219种，
特征、药效与各部位实景彩图结合。

可供中草药爱好者、中草药种养殖户、药材收购部门、
大专院校师生参考。

ISBN 978-7-122-19230-1

9 787122 192301 >

销售分类建议：中医 / 中药

编辑投稿信箱：tarker_lily@yahoo.com.cn

定价：39.00 元

亲近大自然系列

常见中草药野外识别图鉴

车晋滇 编著

化学工业出版社
·北 京·

本书收录了我国南北方常见主要中草药219种（植物184种，动物35种），并对它们的识别特征、药用功效进行了简要介绍。每种中草药均配有实地拍摄的彩色图片或实物图片，便于读者鉴别使用。本书图文并茂，内容丰富，文字简练，通俗易懂，实用性强。可供中草药爱好者、中草药种养殖户、药材收购部门、相关院校中药专业师生参考使用。

图书在版编目（CIP）数据

常见中草药野外识别图鉴 / 车晋滇编著 . —北京：化学工业出版社，2014.1
（亲近大自然系列）
ISBN 978-7-122-19230-1

Ⅰ. ①常… Ⅱ. ①车… Ⅲ. ①中草药 - 识别 - 图集
Ⅳ. ① R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 291976 号

责任编辑：李 丽　　装帧设计：关 飞
责任校对：顾淑云

出版发行：化学工业出版社
（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司
710mm × 1000mm 1/32 印张 7 1/2 字数 204 千字
2014 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686）
售后服务：010-64518899
网 址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.00元

版权所有 违者必究

前言

我国是世界上利用中草药预防和治疗疾病最早的国家之一。早在明朝，伟大的医药学家李时珍用毕生的精力编著出版了《本草纲目》这部巨著。书中收录药物1892种，收录附方11096个，为医药学作出了巨大贡献。中医药在几千年的历史发展过程中，不断完善，积累了丰富的经验，对人类预防和治疗疾病发挥了不可磨灭的历史功绩，并形成了祖国独特的传统中医药文化。

野生中草药生长在良好的自然生态环境中，具备无工业化污染的特点，是纯天然的绿色安全中草药资源库。野生中草药品质高，药性好，取材方便，经济实惠。随着人们保健意识的不断增强，充分利用野生中草药资源，可以预防和治疗一些疾病，起到食疗保健、强身健体的作用。

编写本书的目的是：帮助广大读者识别常见中草药，了解一些中草药方面的基本知识。在广大农村，充分开发利用野生中草药资源，有些种类可以进行人工栽培，做到土地多元化种植，增加农民的经济收入。本书的特点是：彩色图片清晰，识别特征明显，文字简练，通俗易懂，实用性强。

由于篇幅所限，本书重点介绍了我国南北方分布广，较常见，易于采集的中草药219种，每种中草药均配有实地拍摄的彩色图片或实物图片，便于读者对照彩色图片和简要的文字识别中草药。本书编写中得到北京市植物保护站的支持和帮助，在此深表感谢！

由于作者水平有限，书中疏漏之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

作　者

2014年1月

目录

第一章　植物药材 / 001

一、蕨类植物药材 / 002

木贼科 / 002

节节草 / 002

卷柏科 / 003

卷柏 / 003

海金沙科 / 004

海金沙 / 004

里白科 / 005

芒萁 / 005

凤尾蕨科 / 006

蕨 / 006

中国蕨科 / 007

银粉背蕨 / 007

球子蕨科 / 008

荚果蕨 / 008

铁角蕨科 / 009

鸟巢蕨 / 009

肾蕨科 / 010

肾蕨 / 010

水龙骨科 / 011

槲蕨 / 011

有柄石韦 / 012

苹科 / 013

四叶苹 / 013

槐叶苹科 / 014

槐叶苹 / 014

满江红科 / 015

满江红 / 015

二、裸子植物药材 / 016

苏铁科 / 016

苏铁 / 016

银杏科 / 017

银杏 / 017

松科 / 018

白皮松 / 018

油松 / 019

柏科 / 020

侧柏 / 020

三、被子植物药材 / 021

三白草科 / 021

鱼腥草 / 021

桑科 / 022

大麻 / 022

桑 / 023
构树 / 024
无花果 / 025
马兜铃科 / 026
马兜铃 / 026
蓼科 / 027
拳参 / 027
杠板归 / 028
何首乌 / 029
金荞麦 / 030
藜科 / 031
地肤 / 031
土荆芥 / 032
苋科 / 033
青葙 / 033
鸡冠花 / 034
千日红 / 035
牛膝 / 036
马齿苋科 / 037
马齿苋 / 037
土人参 / 038
石竹科 / 039
瞿麦 / 039
石竹 / 040
睡莲科 / 041
莲 / 041
鸡头米 / 042
毛茛科 / 043
芍药 / 043
牡丹 / 044
金莲花 / 045
草乌 / 046
小檗科 / 047
阔叶十大功劳 / 047
木兰科 / 048
玉兰 / 048
辛夷 / 049
五味子 / 050
十字花科 / 051
板蓝根 / 051
葶苈子 / 052
景天科 / 053
垂盆草 / 053
瓦松 / 054
虎耳草科 / 055
虎耳草 / 055
红升麻 / 056
杜仲科 / 057
杜仲 / 057
蔷薇科 / 058
桃仁 / 058
杏仁 / 059

山楂 / 060
贴梗海棠 / 061
玫瑰花 / 062
月季 / 063
仙鹤草 / 064
豆科 / 065
白扁豆 / 065
甘草 / 066
望江南 / 067
决明 / 068
胡卢巴 / 069
膜荚黄芪 / 070
葛 / 071
苦参 / 072
槐 / 073
蒺藜科 / 074
蒺藜 / 074
芸香科 / 075
花椒 / 075
橘皮 / 076
远志科 / 077
远志 / 077
西伯利亚远志 / 078
大戟科 / 079
猩猩草 / 079
飞扬草 / 080
铁苋菜 / 081
蓖麻 / 082
铁海棠 / 083
鼠李科 / 084
酸枣 / 084
大枣 / 085
枳椇 / 086
葡萄科 / 087
乌敛莓 / 087
葎叶蛇葡萄 / 088
爬山虎 / 089
锦葵科 / 090
野西瓜苗 / 090
苘麻 / 091
朱槿 / 092
木槿 / 093
木芙蓉 / 094
梧桐科 / 095
梧桐 / 095
仙人掌科 / 096
仙人掌 / 096
胡颓子科 / 097
沙棘 / 097
石榴科 / 098
石榴 / 098
野牡丹科 / 099

野牡丹 / 099
五加科 / 100
刺五加 / 100
人参 / 101
三七 / 102
伞形科 / 103
柴胡 / 103
防风 / 104
白芷 / 105
木犀科 / 106
连翘 / 106
龙胆科 / 107
秦艽 / 107
夹竹桃科 / 108
长春花 / 108
罗布麻 / 109
旋花科 / 110
海红薯 / 110
牵牛 / 111
菟丝子 / 112
列当科 / 113
黄花列当 / 113
马鞭草科 / 114
马缨丹 / 114
马鞭草 / 115
假马鞭草 / 116
牡荆 / 117
唇形科 / 118
黄芩 / 118
藿香 / 119
裂叶荆芥 / 120
活血丹 / 121
益母草 / 122
薄荷 / 123
罗勒 / 124
紫苏 / 125
丹参 / 126
茄科 / 127
龙葵 / 127
天仙子 / 128
洋金花 / 129
枸杞 / 130
玄参科 / 131
地黄 / 131
冰糖草 / 132
毛泡桐 / 133
车前科 / 134
车前 / 134
茜草科 / 135
耳草 / 135
茜草 / 136
忍冬科 / 137

金银花 / 137
葫芦科 / 138
冬瓜 / 138
苦瓜 / 139
栝楼 / 140
桔梗科 / 141
党参 / 141
羊乳 / 142
桔梗 / 143
菊科 / 144
艾蒿 / 144
茵陈蒿 / 145
牛蒡 / 146
三叶鬼针草 / 147
鬼针草 / 148
马兰 / 149
金腰箭 / 150
金纽扣 / 151
蒲公英 / 152
苍耳 / 153
甘野菊 / 154
红花 / 155
土木香 / 156
泽泻科 / 157
野慈姑 / 157
禾本科 / 158
芦苇 / 158
白茅 / 159
薏苡 / 160
莎草科 / 161
香附子 / 161
天南星科 / 162
半夏 / 162
掌叶半夏 / 163
海芋 / 164
鸭跖草科 / 165
鸭跖草 / 165
吊竹梅 / 166
百合科 / 167
黄精 / 167
玉竹 / 168
卷丹 / 169
山丹 / 170
知母 / 171
韭菜 / 172
薤白 / 173
萱草 / 174
沿阶草 / 175
石蒜科 / 176
石蒜 / 176
红玉帘 / 177
薯蓣科 / 178

薯蓣 / 178
穿山龙 / 179
鸢尾科 / 180
射干 / 180
鸢尾 / 181
马蔺 / 182
兰科 / 183
天麻 / 183
多孔菌科 / 184
灵芝 / 184
海带科 / 185
昆布 / 185

第二章　动物药材 / 186

一、陆地动物药材 / 187

斑翅蝗科 / 187
东亚飞蝗 / 187
斑腿蝗科 / 188
中华稻蝗 / 188
蟋蟀科 / 189
蟋蟀 / 189
蝼蛄科 / 190
蝼蛄 / 190
蚕蛾科 / 191
家蚕 / 191
蝉科 / 192
蚱蝉 / 192
蝙蝠蛾科 / 193
冬虫夏草 / 193
蜜蜂科 / 194
蜜蜂 / 194
蚁科 / 196
鼎突多刺蚁 / 196
蝽科 / 197
九香虫 / 197
蜚蠊科 / 198
土鳖 / 198
钳蝎科 / 199
东亚钳蝎 / 199
蜈蚣科 / 200
蜈蚣 / 200
鹿科 / 201
鹿茸 / 201
熊科 / 202
熊 / 202
雉科 / 203
乌骨鸡 / 203
鸡内金 / 204
鸠鸽科 / 205
鸽子 / 205
文鸟科 / 206
麻雀 / 206

壁虎科 / 207
蛤蚧 / 207
二、水生动物药材 / 208
龟科 / 208
龟 / 208
鳖科 / 209
鳖 / 209
蟾蜍科 / 210
中华蟾蜍 / 210
田螺科 / 211
螺蛳 / 211
蚌科 / 212
背角无齿蚌 / 212
鲍科 / 213
石决明 / 213
牡蛎科 / 214
牡蛎 / 214
蚶科 / 215
瓦楞子 / 215
帘蛤科 / 216
文蛤 / 216
青蛤 / 217
贻贝科 / 218
淡菜 / 218
乌贼科 / 219
海螵蛸 / 219
海龙科 / 220
刺海马 / 220
线纹海马 / 221
海龙 / 222
中文名称索引 / 223
拉丁文名称索引 / 226
参考文献 / 230

第一章　植物药材



一、蕨类植物药材

木贼科

节节草（土麻黄、笔筒草、木贼草）

Equisetum ramosissimum Desf.

【识别特征】木贼科。多年生草本。根茎黑褐色。茎一型，灰绿色，直立，中空；茎节上有2～5分枝。叶鞘长度为直径的1～2倍。鞘齿三角形，黑色，有易脱落的膜质尾尖。孢子囊穗生茎顶，长圆形，有小尖头，无柄。孢子叶六角形，中央凹入，孢子一形。

【分布生境】全国各地。生水沟边、山坡，沙质地，道路旁。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味甘苦，平。祛风清热、除湿利尿。用于目赤肿痛，翳膜遮眼，尿血等症。

卷柏科

卷柏（石莲花、还阳草、万年青）

Selaginella tamariscina (Beauv.) Spr.

【识别特征】卷柏科。多年生草本。枝丛生成莲座状。叶二形，侧叶斜卵状钻形，长约2.5mm，宽1.5mm，先端具长芒，外缘向下面反卷；中叶两排斜向排列，内缘不成二平行线，先端具长芒。

【分布生境】全国各地。生山坡岩石缝中。

【药用功效】全草入药，春、秋季采集。性味辛，平。收敛止血。生用治经闭，跌打损伤，腹痛，哮喘等。炒用治吐血，便血，尿血，脱肛等症。

海金沙（铁线藤、左转藤）

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

【识别特征】海金沙科。多年生攀缘草本。茎细长。叶二型，营养叶尖三角形，2回羽状，小羽叶片边缘有浅钝齿；孢子叶卵状三角形，羽片边缘有流苏状孢子囊。孢子囊梨形。孢子期5 ~ 11月。

【分布生境】全国大部分地区有分布。生山坡灌木丛。

【药用功效】孢子粉入药，秋季采集。性味甘，寒。清利湿热、通淋止痛。用于小便不利，热淋，尿道涩痛等症。

里白科

芒萁（山蕨、芒萁骨）

Dicranopteris dichotoma (Thunb.) Bernh.

【识别特征】里白科。多年生草本。根状茎细长横走，棕褐色，被棕色鳞片。叶片疏生，叶轴1～2回或多回分叉，在每一交叉处两侧各有1片羽状托叶；末回羽片披针形，先端渐狭成尾尖；篦齿状羽裂深达羽轴，叶背面呈灰白色或灰蓝色。

【分布生境】长江流域以南及西南等地。生林下或山坡酸性土壤上。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味苦，平。清热利尿、祛瘀止血。用于妇女崩带，尿道炎，外伤出血，烫伤，伤口溃烂，疝气等症。

蕨（拳头菜、粉蕨、如意菜）

Pteridium aquilinum (L.) kuhu ver.*latiusculum* (Desv.) Underw.

【识别特征】凤尾蕨科。多年生草本。地下根状茎横走，黑色。叶幼时呈拳状卷曲，展开时呈阔三角形，3 ~ 4回羽裂，末回小羽叶钝头。孢子囊群线形，着生于小脉顶端的连接脉上，沿叶缘分布。

【分布生境】全国各地区。生山坡阴地及林缘中。

【药用功效】全草入药，秋、冬采集。性味甘，寒。清热利湿、消肿、安神。用于发热，湿热黄疸，头昏失眠，高血压病等症。

中国蕨科

银粉背蕨（紫背金牛、通经草）

Aleuritopteris argenter (Gmel.)Fée Gen.Fil.

【识别特征】中国蕨科。多年生草本。叶簇生，叶柄栗红色。叶片三角状五角形，上面绿色，背面被乳白色或淡黄色蜡质粉末；2～3回羽状分裂，最下面的羽片最长；中脉明显，侧脉通常二叉，不明显。孢子囊群着生于叶缘的细脉顶端，为反卷的叶缘所包被。

【分布生境】东北、华北、西北、西南。生山坡岩石缝隙中。

【药用功效】全草入药，秋季采集。性味平，淡。调经补血、补虚、止咳。用于月经不调，赤白带下，咳嗽等症。

荚果蕨（野鸡膀子、黄瓜香、小叶贯众）

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro

【识别特征】球子蕨科。多年生草本。根状茎短。叶二型，不育叶片椭圆状倒披针形，幼时呈拳状卷曲，鲜绿色，成长后叶片展开，2回羽状深裂，叶脉羽状，侧脉不分枝。孢子叶的叶片为狭披针形一回羽状，羽片向背面反卷成荚果状，深褐色。孢子囊群圆形，具膜质囊群盖。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生林下或山谷荫湿处。

【药用功效】全草入药，秋季采集。性味微苦，凉。具滋阴补虚、清热解毒、杀虫等功效。用于风热感冒，湿热肿痛，赤痢便血，子宫出血，蛲虫病等症。

铁角蕨科

鸟巢蕨（巢蕨、山苏花、铁蚂蝗）

Neottopteris nidus (L.) J.Sm.

【识别特征】铁角蕨科。多年生草本。叶丛生于根状茎周围。叶片条状倒披针形，两面光滑，中脉明显突起；叶柄短粗。孢子囊线形，生于叶片背面侧脉间。

【分布生境】华南、西南等地。生林中、或石缝中。

【药用功效】全草入药，全年可采。性味苦，温。强精壮骨、活血祛瘀。用于骨折，阳痿，跌打损伤等症。

肾蕨（蜈蚣草、石黄皮、圆羊齿）

Nephrolepis auriculata (Linn.) Trimen

【识别特征】肾蕨科。根状茎直立，密被鳞片。叶丛生，叶片狭披针形，一回羽裂；羽片多数，无叶柄。孢子囊群生于侧小脉的顶端沿，中脉两侧各排成1行；孢子囊群盖肾形，棕褐色。

【分布生境】浙江以南。生灌木丛、溪边、林下石缝中。

【药用功效】球状块根入药，全年采集。性味甘，淡，微凉。清热利湿、宁肺止咳。用于感冒发热，肺热咳嗽，腹肠炎泻，黄疸，淋巴结炎等症。

水龙骨科

槲蕨（石岩姜、岩连姜、骨碎补）

Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm.

【识别特征】水龙骨科。根茎横走，肥厚肉质，密被棕黄色鳞片。叶片二型，营养叶灰棕色或红棕色，革质，卵形，边缘羽状浅裂，无叶柄，很像槲树叶。孢子叶绿色，长椭圆形或矩圆形，羽状深裂，裂片互生，广披针形，具短柄，叶柄有翅，叶脉网状。孢子囊群着生在裂片的背面，圆形，黄褐色，无盖，在中脉两侧各有2 ~ 3行。

【分布生境】华中、华南、西南等地。附生于树干或石上。

【药用功效】根茎入药，全年可采集。性味苦，温。补肾坚骨、活血止血。用于跌打损伤，骨伤，肾虚腰痛，风湿痹痛等症。

有柄石韦（长柄石韦、石茶）

Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching

【识别特征】水龙骨科。多年生草本。根状茎细长横走，密被棕褐色鳞片。叶片长圆形或卵状长圆形，具排列整齐的小凹点。叶背面密被棕色星状毛。孢子囊群深棕色，生叶背面。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡岩石或树干上。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味甘，凉。利水通淋、清肺泻热。用于尿路结石，肾炎，肺热咳嗽等症。

四叶苹（田字苹、四叶草）

Marsilea quadrifolia L.

【识别特征】苹科。多年生水生草本。地下有细长的匍匐根茎。叶柄细长；小叶倒三角形，全缘，四片对生在叶柄上。

【分布生境】全国各地。生水塘、河湖边、稻田中。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味甘，凉。清热解毒、利水消肿、安神。用于尿路结石，肾炎，肺热咳嗽等症。



槐叶苹（蜈蚣萍、大浮萍）

Salvinia natans (L.) All.

【识别特征】槐叶苹科。一年生浮水草本。茎细长横走。叶羽状排列茎的两侧。叶长圆形，全缘，上面淡绿色，侧脉有刺毛，下面被棕色透明的毛茸。孢子果圆球形，丛生于根状叶的基部。

【分布生境】全国各地。生水田中。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，平。清热解毒、活血止痛。用于劳热，浮肿，湿疹，疔疮，火烫伤等症。

满江红科

满江红（红浮萍、绿萍、水浮漂）

Azolla imbricata (Roxb.) Nakai

【识别特征】满江红科。一年生浮水草本。叶小，无柄，鳞片状，互生，覆瓦状排列，卵形或斜方形。叶片绿色，成熟时褐红色。孢子果均生在分枝基部的沉水叶片上。

【分布生境】全国各地。生水塘中。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。发汗、利尿。性味辛，寒。祛风湿、透疹。用于风湿疼痛，麻疹透发不出，烫火伤等症。

二、裸子植物药材

苏铁科

苏铁（铁树、凤尾蕉叶、大凤尾）

Cycas revolute Thunb.

【识别特征】苏铁科。常绿灌木或乔木。树干粗壮，圆柱形，有明显的叶痕。羽状复叶，羽片达20对以上，革质，线状披针形，边缘向外反卷。雄花序圆柱形；雌花序半球形，心皮叶阔卵形，密被褐色毡毛，蓖状深裂。果实卵形，压扁。花果期7～8月。

【分布生境】华南、西南等地。现广为栽培供观赏。

【药用功效】叶、花、种子入药，秋季采集。性甘，酸，微温。理气、活血祛瘀。用于肝胃气痛，吐血，跌打损伤等症。



银杏科

银杏（白果、公孙树）

Ginkgo biloba L.

【识别特征】银杏科。落叶乔木。树皮灰色。叶扇形，先端有时开裂，基部楔形，叶脉二叉状。雌雄异株。雌球花生于短枝叶腋，黄绿色；雄球花为柔荑花序。种子核果状，近球状椭圆形，外种皮肉质，成熟时黄色或橙色表面有粉霜。花果期4～10月。

【分布生境】全国大部分地区栽培。

【药用功效】种子、叶入药，夏、秋季采集。种子性味甘，苦，涩，平，有毒。敛肺气、定喘咳。用于哮喘，咳嗽，白带，白浊，遗精，小便频数等症。

松科

白皮松（三针松、白骨松、松果）

Pinus bungeana Zucc.

【识别特征】松科。常绿乔木。树皮灰绿色，裂片不规则状脱落。叶3针一束。雄花序，无梗，卵状椭圆形，生于新枝条的基部或上部，聚集成穗状。雌花序1至数枚生于新枝的先端或上部。球果卵球形，长5 ~ 10cm，柄极短。花期5月。

【分布生境】华北、华中、西北、西南等地。广为栽培。

【药用功效】球果入药，秋季采集。性味苦，温。镇咳、祛痰、消炎、平喘。用于咳嗽，吐白沫痰，慢性支气管炎等症。

油松（红皮松、松节）

Pinus tabulaeformis Carr.

【识别特征】松科。常绿乔木。树皮灰褐色，呈鳞甲状裂。叶针形，2针一束。叶鞘宿存。花单性，雌雄同株；雄球序长卵形，生于小枝顶端，花开后成柔荑状。雌球序阔卵形，1～2枚生于新枝顶端。花期5月。

【分布生境】东北、华北、华中、西北等地。广为栽培。

【药用功效】松节、松针、松油入药，夏、秋季采集。性味苦，温。祛风湿、散寒、舒筋、通络。用于风痛，转筋挛急，膝风，跌损瘀血等症。

侧柏（柏树、扁柏、柏仁）

Platycladus orientalis(L.)

【识别特征】柏科。常绿乔木。树皮纵裂成长条片剥落。小枝扁平。叶全为鳞片状，交互对生。雌雄同株，球花生枝顶。球果有种鳞4对，成熟后木质化开裂。种子长卵形，无翅，黑灰褐色。花果期3 ~ 5月，果期8 ~ 10月。

【分布生境】除青海、西藏外，各地均有分布。广为栽培。

【药用功效】枝叶，种子入药，秋季采集。性味苦，涩，寒。凉血止血、生发乌发、祛风湿，止咳，安神。用于吐血，便血，血热脱发，须发早白等症。

三白草科

鱼腥草（蕺菜、扯耳根、臭菜）

Houttuynia cordata Thunb.

【识别特征】三白草科。多年生草本，具鱼腥味。地下茎白黄色，节部生根。叶互生，基部心形；叶柄基部鞘状。穗状花序生茎顶，花瓣状总苞片4～5枚，白色。蒴果卵圆形，顶端开裂。花果期5～11月。

【分布生境】长江以南各地区。喜生沟渠边、田埂及湿润地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，微寒。清热解毒、消炎排脓、利尿通淋。用于肺脓肿，肾炎水肿，尿路感染，痈肿疮毒，乳腺炎，肠炎，痢疾等症。



大麻（火麻仁、麻仁、大麻子）

Cannabis sativa L.

【识别特征】桑科。一年生草本。茎直立，株体密被短柔毛。叶互生或对生，掌状全裂，裂片披针形，叶缘有锯齿，叶背密生灰白色毡毛。雌雄异株。雄花序圆锥形，花被片5，雄蕊5。雌花序腋生，球形或穗状；花被退化，膜质，紧包子房。瘦果卵圆形，有网纹，灰褐色，为宿存的苞片所包。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生沟渠路边、荒地、山坡。

【药用功效】种子及全草入药，夏、秋季采集。性味甘，平。润燥、滑肠、通便。用于肠燥便秘，消渴，血虚津亏等症。

桑（家桑、桑椹）

Morus alba L.

【识别特征】桑科。落叶乔木。叶片宽卵形或不规则分裂，叶缘具锯齿。雌雄异株。雌、雄花均为柔荑花序，腋生。聚合果成熟时紫色或白色。花果期5 ~ 6月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】桑叶、根、皮和桑椹入药，夏、秋季采集。桑叶性味甘，寒。祛风清热、凉血明目。用于目赤，头痛，风温发热，口渴，肺热咳嗽等症。

构树（构桃树、楮树、楮实）

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.

【识别特征】桑科。落叶乔木。叶片卵形，不裂或3 ~ 5深裂，具粗糙伏毛。雌雄异株。雄花为柔荑花序，腋生；雌花序头状。聚花果球形，肉质，成熟时橘红色。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】华北以南各地区。生山坡、杂树林、沟谷、公园及庭院。

【药用功效】果实和根皮入药，夏、秋季采集。性味甘，寒。补肾、清肝、明目。用于腰膝酸软、肾虚、目昏、水肿等症。叶和乳汁可搽治癣疮。

无花果（隐花果、文仙果、蜜果）

Ficus carica L.

【识别特征】桑科。落叶灌木或小乔木。株体具乳汁，多分枝。叶片掌状3～5裂，少有不裂，具明显的掌状脉，叶面粗糙，叶背面被短毛，叶缘具齿。隐头花序梨形，单生叶腋，初时绿色，成熟时肉质化红褐色。花期8～10月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味甘，平。健胃清肠，消肿解毒。用于肠炎，痢疾，便秘，痔疮等症。



马兜铃（北马兜铃、圆叶马兜铃、蛇参果）

Aristolochia contorta Bge.

【识别特征】马兜铃科。多年生缠绕草本。茎细长。叶互生，叶片三角状阔卵形，先端渐尖，基部心形，全缘。基出脉5 ~ 7条。花数朵簇生叶腋间，花被筒上部成二唇形开展，先端延伸成细线状的尾尖。蒴果下垂，广卵形或椭圆状卵形，室间开裂。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡灌丛中。

【药用功效】果实入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清肺降气、止咳化痰。用于肺热咳喘，失音，痔瘘肿痛等症。

蓼科

拳参（紫参、山虾子、破伤药）

Polygonum bistorta L.

【识别特征】蓼科。多年生草本。根茎粗壮，紫褐色。茎单一。基生叶披针形，具长柄，沿叶柄下延成翅。茎生叶渐小，近无柄。穗状花序顶生，花白色。瘦果三棱形，红褐色，包于宿存花被中。花果期6 ~ 11月。

【分布生境】安徽以北各地区。生山坡草甸、林下。

【药用功效】根茎入药，春、秋季采集。性味苦，涩，微寒。清热解毒、凉血。用于破伤风，痢疾，肠炎，肝炎，咽喉炎等症。

杠板归（犁头刺、贯叶蓼、地葡萄）

Polygonum perfoliatum L.

【识别特征】蓼科。一年生草本。茎蔓生，具棱，棱上疏生倒钩刺。叶三角形，疏生小钩刺；叶柄盾状着生。托叶鞘近圆形，穿茎。花序短穗状，顶生或腋生。花白色或淡红色。瘦果球形，包于蓝色的花被内。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生山沟、灌丛中。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味酸，苦，平。清热解毒、活血消肿。用于水肿，黄疸，百日咳，丹毒，湿疹等症。

何首乌（首乌、夜交藤、多花蓼、马肝石）

Polygonum muliflorum Thunb.

【识别特征】蓼科。多年生缠绕草本。地下块根肥大，圆块形或不规则纺锤形，暗红色或棕黑色。叶互生，卵状心形，基部心形。圆锥花序顶生或腋生，花白绿色，花被5深裂，外面3片背部有翅。瘦果椭圆形，包于宿存的花被内，黑色，有光泽。花果期8 ~ 11月。

【分布生境】河南以南各地区。生山坡灌丛、林下。广为栽培。

【药用功效】块根入药，春、秋季采集。性味苦，甘，涩，温。补肝、益肾、养血、通便。用于肝肾阴亏，须发早白，腰膝酸软，筋骨酸痛，血虚头晕，神经衰弱等症。

金荞麦（荞麦三七、金锁银开）

Fagopyum dibotrys (D.Don) Hara

【识别特征】蓼科。多年生草本。根茎粗大横走，红棕色。茎直立，绿色或红褐色。叶互生，戟状三角形，长宽几相等。托叶鞘近筒状斜形，膜质。花小，集成顶生的聚伞花序。花被片5，白色；雄蕊8；雌蕊1；花柱3。瘦果卵状3棱形。花果期7～11月。

【分布生境】华东、中南、西南、西北等地。生山坡、沟谷、田野、沟渠地边。广为栽培。

【药用功效】根茎入药，夏、秋季采集。性味酸，苦，寒。清热解毒、活血消痈、祛风除湿。用于咽喉肿痛，肺脓肿，痢疾，风湿性关节炎，跌打损伤等症。

藜科

地肤（扫帚苗、地肤子）

Kochia scoparia (L.) Schrad.

【识别特征】藜科。一年生草本。茎直立，被短柔毛。叶片条状披针形，两面被短柔毛，有3条明显主脉。茎生叶较小，有1脉。花两性或雌性，常1～3花簇生叶腋，构成穗状圆锥花序。果实扁球形，包于花被内。种子卵形，黑褐色，稍有光泽。花果期6～10月。

【分布生境】全国各地。生田野、路旁、荒地、村寨旁。

【药用功效】全株和种子入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清热解毒、利尿通淋。用于痢疾，目赤，皮肤风热赤肿等症。

土荆芥（藜荆芥、杀虫芥、臭草）

Chenopodium ambrosioides L.

【识别特征】藜科。一年生或多年生草本，有特殊气味。茎直立，多分枝。叶片长圆状披针形，叶缘具大锯齿，叶背散生油点并沿脉稍有毛，叶具短柄。花两性或雌性，通常3～5朵簇生于上部叶腋，排列成穗状或圆锥花序。花被5裂，绿色；雄蕊5；柱头通常为3，伸出花被外。胞果双凸透镜形，包于花被内。种子圆肾形，黄褐色或红褐色，表面有微细凹点，具光泽。花果期6～10月。

【分布生境】华中、华南、西南等地。生路边、旷野、山地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，温，有毒。祛风、杀虫、通经、止痛。用于皮肤湿疹，瘙痒，蛔虫，钩虫，痛经，蛇虫咬伤等症。

苋科

青葙（青葙子、野鸡冠花、鸡冠苋）

Celosia argentea L.

【识别特征】苋科。一年生草本。茎直立。叶片披针形，全缘。花序圆柱形，单生茎顶或枝端，花密生。苞片和花被片干膜质，粉红色或白色。胞果卵形，盖裂。种子小，肾状圆形，黑色，有光泽。花果期5 ~ 10月。

【分布生境】长江以南各地区。生农田、山坡、荒地。

【药用功效】种子入药，夏、秋季采集。性味苦，微寒。清热明目、祛风除湿。用于风火眼赤，风瘙身痒，肝火眩晕等症。

鸡冠花（老来红、红鸡冠）

Celosia cristata L.

【识别特征】苋科。一年生草本。茎直立。叶互生，卵状披针形。花序生茎顶，鸡冠状，红色、淡红色或黄色。胞果卵形，盖裂。种子扁圆形，黑色，有光泽。花果期7 ~ 11月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】花序和种子入药，秋季采集。性味甘，涩，凉。止血、凉血、止痢。用于吐血，便血，痔血，崩漏等症。

千日红（百日红、火球花）

Gomphrena globosa L.

【识别特征】苋科。一年生草本。茎直立，分枝，被糙毛。叶对生，椭圆形或长圆状倒卵形。头状花序球形，花紫红色、深红色、粉红色或白色。胞果近球形。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地均有栽培。

【药用功效】花序入药，秋季采集。性味甘，平。平肝明目、止咳定喘。用于目痛，气喘咳嗽，百日咳，小儿惊风痢疾等症。

牛膝（怀牛膝、土牛膝、山苋菜）

Achyranthes bidentata Bl.

【识别特征】苋科。一年生草本。茎四棱形，节部膨大，分枝对生。叶片椭圆状披针形。穗状花序，顶生或叶腋生，花向下反折。小苞片刺状。胞果椭圆形。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】除东北外，全国广布。生山坡林下、沟谷地等。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味甘，苦，酸，平。补肝肾、强筋骨。用于腰膝酸痛，筋骨无力，肝阳眩晕等症。

马齿苋科

马齿苋（麻生菜、长命菜、马齿菜）

Portulaca oleracea L.

【识别特征】马齿苋科。一年生肉质草本。茎匍匐地面，多分枝。叶片肉质倒卵形，先端钝圆，基部宽楔形。花黄色，常3～8朵簇生于枝端叶腋，花瓣5，倒卵形，先端凹缺。蒴果圆锥形，盖裂。种子肾状卵形，黑色。花果期5～9月。

【分布生境】全国各地。生农田、果园、荒地及湿润地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味酸，寒。清热解毒、凉血消肿。用于痢疾脓血，肠炎，痈肿恶疮，丹毒，带下等症。

土人参（土洋参、土高丽参、假人参）

Talinum paniculatum (Jacq) Gaertn.

【识别特征】马齿苋科。多年生肉质草本。主根粗壮，似人参。茎直，圆柱形，分枝，高可达60cm。叶片肉质，对生，倒卵状长椭圆形，全缘，光滑。茎顶分枝成长圆锥状花序，常二歧分枝，花多数，淡紫红色；花瓣5，倒卵形或椭圆形；雄蕊18枚左右；子房球形，花柱线形，柱头3深裂。蒴果近球形，3瓣裂。种子小，扁圆形，灰褐色至黑色，有光泽。花期5～7月，果期8～10月。

【分布生境】河南以南各地区。喜温暖湿润环境，喜肥沃疏松的沙性土壤。广为栽培。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味甘，平。健脾润肺、止咳、调经。用于脾虚劳倦，肺痨咳嗽带血，盗汗自汗，月经不调等症。

石竹科

瞿麦（竹节草、剪绒花、山瞿麦）

Dianthus superbus L.

【识别特征】石竹科。多年生草本。茎直立，上部二歧分枝，节明显。叶片线状披针形。花单生或数朵集成疏聚伞花序。花瓣粉紫色，先端深细裂成丝状。蒴果长筒形，4齿裂。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生山坡草甸。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清热利水、破血通经。用于小便不畅，淋病，水肿，痈肿，经闭等症。

石竹（洛阳花、石柱花）

Dianthus chinensis L.

【识别特征】石竹科。多年生草本。茎直立，节明显。叶片线状披针形。聚伞花序生茎顶。萼圆筒形，先端5裂。花鲜红色、粉红色或白色。蒴果包于宿萼内。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生山坡草甸。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清热利水、破血通经。用于小便不畅，淋病，水肿，痈肿，经闭等症。

睡莲科

莲（荷花、莲藕、藕节、莲子）

Nelumbo nucifera Gaertn.

【识别特征】睡莲科。多年生水生草本。根茎肥大为藕。叶柄长圆柱形，中空；叶片盾圆形，波状全缘。花大，粉红色或白色。莲蓬圆锥形。种子椭圆形，种皮灰棕色。花果期7～9月。

【分布生境】全国各地。生池塘或浅水域中。广为栽培。

【药用功效】种子、藕节入药，夏、秋季采集。藕节性味甘，凉。除烦解渴、止血健胃。莲子性味甘，涩，平。补脾止泻、养心安神、益肾。用于脾虚久泻，遗精，带下，心悸失眠等症。

鸡头米（芡、芡实、鸡咀莲）

Euryale ferox Salisb.

【识别特征】睡莲科。一年生水生草本。初生叶沉水，箭头状；后生叶浮于水面，盾圆形，有皱褶，下面集生气囊；叶脉有刺。花单生，水面开放。花梗粗长，多刺。花紫红色。浆果球形，内部海绵质，表面密生刺，内含多粒种子。种子球形。花果期7～9月。

【分布生境】全国各地。生池塘或浅水域中。广为栽培。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味甘，涩，平。健脾益胃、固肾涩精、祛湿止带。用于肾虚体弱，脾虚久泻，梦遗滑精，遗尿，尿频，白浊，带下等症。

毛茛科

芍药（白芍、川芍、殿春）

Paeonia lactiflora Pall.

【识别特征】毛茛科。多年生草本。下部茎生叶2回3出复叶，上部叶为3出复叶，小叶狭卵形。花有粉红色等多种颜色。蓇葖果，顶端具喙。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生庭院、公园或花圃。广为栽培。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味苦，酸，微寒。养血调经、平肝止痛、敛阴止汗。用于月经不调，自汗，盗汗等症。

牡丹（木芍药、牡丹皮、洛阳花）

Paeonia suffruticosa Andr.

【识别特征】毛茛科，多年生灌木。叶2回3出复叶；顶生小叶3裂。花单生枝顶，多为重瓣花，有玫瑰色、粉红色等。蓇葖果长圆形，被褐色短毛。花果期5～7月。

【分布生境】主产河南、山东等地。生庭院、公园。广为栽培。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味辛，苦，微寒。清热凉血、活血化瘀。用于月经不调，痈肿疮毒，跌损伤痛等症。

金莲花（旱金莲、金梅草）

Trollius chinensis Bge.

【识别特征】毛茛科。多年生草本。茎直立，不分枝。茎生叶片轮廓五角形，3全裂；中裂片菱形，3裂近中部，2回裂片有少数小裂片和锐牙齿，茎上部叶片渐小。花通常单生，金黄色。萼片多数，黄色，椭圆状倒卵形或倒卵形。蓇葖果，具脉网，顶端具稍向外弯的短喙。种子近倒卵形，黑色。花果期6～9月。

【分布生境】东北、华北、河南等地。生山坡草地，林缘中。

【药用功效】花入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清热解毒、祛瘀消肿、抗菌消炎。用于急性扁桃体炎、上呼吸道感染，咽炎，中耳炎，急性结膜炎，急性淋巴管炎，痈肿疮毒等症。

草乌（北乌头、百步草）

Aconitum kusnezoffii Reichb.

【识别特征】毛茛科。多年生草本。块根倒圆锥形，暗黄褐色。茎生叶五角形，3全裂；中央裂片菱形，渐尖，近羽状深裂，小裂片披针形，上面疏生短柔毛，下面无毛。总状花序长，小苞片线形。萼片5，紫蓝色，上萼片盔形；花瓣2，有长爪，距向后弯曲。蓇葖果。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】东北、华北等地。生山坡草地，疏林中。

【药用功效】块根入药，秋季采集。性味辛，苦，有大毒。祛风除湿、散寒止痛。块根经炮制后，用于风寒湿痹，关节疼痛，心腹冷痛，麻醉止痛等症。

小檗科

阔叶十大功劳（十大功劳、土黄连、功劳木）

Mahonia bealei (Fort.) Carr.

【识别特征】小檗科。常绿灌木。叶互生，革质，奇数羽状复叶；小叶阔卵形至卵状椭圆性，边缘反卷，每边有2～7枚尖刺。总状花序顶生，丛生，萼片9，3轮，花黄色，花瓣6。浆果卵圆形，熟时蓝黑色，被白粉。花果期7～12月。

【分布生境】陕西、安徽、浙江、江西、福建、河南、湖北、湖南、贵州、四川、云南等地。生山谷、灌丛中。

【药用功效】全株入药，全年可采集。性味苦，寒。补肺气、清热、燥湿、益肝肾。用于肺热咳嗽，目赤肿痛，胃火牙痛，头痛，腰膝无力，黄疸性肝炎，湿疹，肠炎腹泻等症。

玉兰（白玉兰、木兰）

Magnolia denudata Desr.

【识别特征】木兰科。落叶乔木。小枝淡灰褐色。叶倒卵形或倒卵状长圆形，先端突尖，基部楔形或宽楔形，全缘。沿叶脉有柔毛。花单生小枝顶端，花白色。花被片9，倒卵形，萼片与花瓣无明显区别。聚合蓇葖果，密生褐色茸毛。花果期4 ～ 5月。

【分布生境】全国大部分地区有栽培。

【药用功效】花蕾（称辛夷）入药，早春花蕾未开放时采集。性味辛，温。祛风、通窍。用于鼻塞不通，鼻流浊涕，齿痛，风寒头痛等症。

辛夷（紫玉兰、木笔花、辛夷桃）

Magnolia liliflora Desr.

【识别特征】木兰科。落叶乔木。小枝紫褐色。叶倒卵形或倒卵状长圆形，先端急尖或渐尖，基部楔形，全缘。沿叶脉有柔毛。花单生小枝顶端。萼片与花瓣有明显区别；萼片3，较小，绿色，早落。花瓣6，外面紫色或紫红色，里面白色。聚合蓇葖果，密生褐色茸毛。花果期4 ~ 7月。

【分布生境】全国大部分地区有栽培。

【药用功效】花蕾（称辛夷）入药，早春花蕾未放时采集。性味辛，温。祛风、通窍。用于鼻塞不通，鼻流浊涕，齿痛，风寒头痛等症。

五味子（北五味子、山花椒、五梅子）

Schisandra chinensis (Turcz.)Baill.

【识别特征】木兰科。多年生落叶木质藤本。小枝灰褐色，皮孔明显。叶互生，宽卵圆形或倒卵形，先端急尖或渐尖，基部楔形，叶缘有细齿；叶柄淡粉红色。花单性，雌雄异株，花单生或簇生于叶腋，花梗细长；花被片乳白色或粉红色。果成熟时穗状聚合果。浆果肉质，紫红色。花果期5～9月。

【分布生境】东北、华北、湖南、湖北、四川、江西等地。生半阴湿的山坡灌丛中。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味酸，甘，温。生津止渴、止汗、补肾宁心、收敛固肾。用于津伤口渴，内热消渴，自汗，盗汗，心悸失眠，久咳虚喘，久泻不止，尿频，遗精等症。

十字花科

板蓝根（菘蓝、靛青根、大青叶）

Isatis tinctoria L.

【识别特征】十字花科。二年生草本。主根圆柱形。茎直立，上部多分枝。基生叶莲座状丛生，有长柄。茎生叶互生，长圆状披针形，基部叶耳锐形抱茎。总状花序呈圆锥状，疏松。花黄色，花瓣4，倒披针形。短角果扁长圆形，边缘有翅，顶端微缺。花果期4 ~ 6月。

【分布生境】安徽以北等地。生田野、路旁。广为栽培。

【药用功效】根和叶入药，秋季采根。性味苦，寒。清热解毒、凉血利咽。用于感冒，肝炎，腮腺炎，骨髓炎，喉痹，痈肿等症。

葶苈子（独行菜、辣辣根）

Lepidium apetalum Willd.

【识别特征】十字花科。一年生或越年生草本。茎直立，分枝。基生叶狭匙形或倒披针形，羽状浅裂或深裂。茎生叶披针形，基部耳状抱茎。总状花序顶生，果期伸长，疏松。花极小。短角果，扁平圆形，先端微凹。种子椭圆状卵形，棕红色。花果期4 ~ 6月。

【分布生境】东北、华北、西北、西南等地。生田野、路边。

【药用功效】种子入药称葶苈子，果实成熟时采集。性味苦，寒。止咳化痰、利尿。用于肺壅喘急，痰饮咳嗽，水肿胀满等症。同科植物北美独行菜*Lepidiumvirginicum* L.；播娘蒿*Descurainia sophia* (L.) Schur；葶苈*Draba nemorosa* L.的种子同等入药。

景天科

垂盆草（石指甲、半枝莲、三叶佛甲草）

Sedum sarmentosum Bge.

【识别特征】景天科。多年生肉质草本。茎匍匐，淡红色。叶3枚轮生，倒披针形或长圆形。聚伞花序，花瓣5，黄色。雄蕊10，较花瓣小。心皮5，稍开展。蓇葖果。花果期5～11月。

【分布生境】全国各地。生山坡、石缝中。广为栽培。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味甘淡，凉。清热解毒、消肿。用于咽喉肿痛，肝炎，痈肿，烫伤等症。

瓦松（瓦花、向天草、酸塔）

Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger

【识别特征】景天科。多年生肉质草本。株体密生紫红色小斑点。基生叶莲座状。茎生叶互生，线形。花序圆锥状，花瓣5，淡粉红色。雄蕊10，紫红色。蓇葖果。花果期8～9月。

【分布生境】长江流域以北各地区。生农村房屋瓦缝及山坡岩石缝中。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味酸，平。清热解毒、止血、敛疮。用于便血，泻痢，月经不调，疮口不收等症。

虎耳草科

虎耳草（老虎草、金丝荷叶、石荷叶）

Saxifraga stolonifera Merrb.

【识别特征】虎耳草科。多年生草本，全株被毛。茎生匍匐枝细长。叶肾圆形，上面叶脉具白纹。总状花序，花小白色，5瓣。蒴果卵圆形。花果期5 ~ 11月。

【分布生境】河南以南各地区。生湿阴处，岩石缝中。广为栽培供观赏。

【药用功效】全草入药，春、夏季采集。性味辛，苦，寒。清热解毒、祛湿消肿。用于风热咳嗽，湿疹，风疹瘙痒，中耳炎等症。

红升麻（落新妇、野升麻、虎麻）

Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et. Sav.

【识别特征】虎耳草科。多年生草本。根茎肥厚。基生叶2 ~ 3回三出复叶。圆锥花序，花密集，密生长柔毛。花瓣5，狭条形，紫红色；雄蕊10，花药青色。蓇葖果。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡、灌丛及林下。

【药用功效】根茎入药，秋季采集。性味辛，苦，凉。祛风、清热、止咳。用于风热感冒，发热咳嗽，头痛等症。

杜仲科

杜仲（思仲、丝连皮、扯丝皮）

Eucommia ulmoides Oliv.

【识别特征】杜仲科。落叶乔木。树皮灰色，折断后有银白色橡胶丝。单叶，互生，卵状椭圆形或长圆状卵形。叶缘有锯齿，叶背脉上有毛。雌雄异株，无花被。雄蕊花丝极短；雌花子房狭长，顶端有2叉状花柱。翅果扁，狭椭圆形，花果期3～9月。

【分布生境】主产长江流域以南各地区。广为栽培。

【药用功效】树皮入药，春季采集。性味甘，温。补肝肾、强筋骨、安胎、降血压。用于筋骨无力，肾虚腰痛，妊娠漏血，胎动不安，高血压病等症。

桃仁（大桃仁、扁桃仁、毛桃仁）

Prunus persica Batsch.

【识别特征】蔷薇科。落叶小乔木。叶长圆状披针形。花瓣5，红淡色。核果肉质多汁，果表面密被茸毛。果核表面具深槽及窝孔。花果期4 ~ 9月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】种子入药，熟后采集。性味苦，甘，平。润肠通便、活血祛瘀。用于肠燥便秘，跌打损伤，经闭，通经等症。同属山桃的种子同等入药。

杏仁（苦杏仁）

Prunus armeniaca L.

【识别特征】蔷薇科。落叶小乔木。叶广卵形。花瓣5，白色或淡粉红色。核果橙黄色或黄白色。果核平滑；沿腹缝有纵沟。种子味苦或甜。花果期4 ～ 7月。

【分布生境】北方各地广为栽培。

【药用功效】种子入药，熟后采集。性味苦，微温。止咳平喘、润肠通便。用于肠燥便秘，咳嗽气喘等症。同属其他杏的种子同等入药。

山楂（酸楂、山里果儿）

Crataegus pinnatifida Bge.

【识别特征】蔷薇科。落叶乔木。叶片3 ~ 5对羽状深裂。伞房花序，花白色。果实近球形，深红色，具斑点。花果期5 ~ 10月。

【分布生境】北方地区。生山坡杂木林。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味酸，甘，微温。消食健胃、行气散瘀。用于积食，胃脘胀痛，瘀血经闭，高脂血等症。

贴梗海棠（木瓜、皱皮木瓜、贴梗木瓜）

Chaenomeles speciosa (Sweet) Naka

【识别特征】蔷薇科。落叶灌木。枝条具刺。叶片卵形或椭圆形，叶缘有锯齿。托叶肾形或椭圆形，边缘有尖锐重锯齿，齿尖有腺体。花先叶开放或同时开放。花瓣猩红色。果实球形或卵圆形，黄色或黄绿色，表面有稀疏的浅白色斑点。花果期3 ~ 10月。

【分布生境】河北至南方等地。生公园、庭院等地。广为栽培。

【药用功效】果实入药，夏、秋季果实绿黄时采集。性酸，温。平肝和胃、舒筋活络。用于湿痹，脚气，水肿，腿膝疼痛等症。

玫瑰花（刺玫花、徘徊花、赤蔷薇）

Rosa rugosa Thunb.

【识别特征】蔷薇科。多年生落叶灌木。茎枝被茸毛，有皮刺或针刺。羽状复叶，小叶5 ~ 9，椭圆形或椭圆状倒卵形，叶缘有细锯齿，叶背面被灰白色柔毛及腺体，叶面皱褶。花单生或数朵聚生，花紫红色。蔷薇果，扁球形，砖红色。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】北方地区。生山坡、林缘。

【药用功效】花蕾入药，春季采集。性味甘，微苦，温。理气解郁、和血散瘀。用于肝胃气痛，月经不调，跌打伤痛等症。

月季（四季花、月月红）

Rosa chinensis Jacq.

【识别特征】蔷薇科。与玫瑰花的主要区别是，茎和枝条光滑无毛。叶面无皱褶。花多种颜色。

【分布生境】全国各地。生公园、庭院。广为栽培。

【药用功效】花蕾入药，全年采集。性味甘，温。活血调经。用于月经不调，通经等症。

仙鹤草（龙牙草、黄龙尾）

Agrimonia pilosa Ledeb.

【识别特征】蔷薇科。多年生草本。茎直立，分枝，密被白柔毛。奇数羽状复叶，小叶5 ~ 7对，椭圆状卵形，叶缘有粗齿，叶两面疏生柔毛，无叶柄。托叶亚心形，近全缘或具锯齿。总状花序顶生。苞片细小，常3裂；花瓣黄色。萼筒上部有一圈钩状刺毛。瘦果包于宿存萼筒内。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡、路边、荒地等地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，涩，平。止血、健胃。用于肺病咳血，胃溃疡出血，痔疮出血等症。

白扁豆（牛耳豆、眉豆、肉豆）

Dolichos lablab L.

【识别特征】豆科。一年生缠绕草本。茎枝常呈紫红色或绿色。三出复叶，顶生小叶菱状广卵形，侧生小叶斜卵形，叶片两面有短毛。总状花序腋生，花冠紫红色或白色。荚果扁，镰刀状，白色、绿色或紫红色。种子椭圆形，黑紫色或黄褐色。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味甘，微温。健脾化湿、和中消暑。用于食欲不振，脾胃虚弱，胸闷腹胀，暑湿吐泻，大便溏泻，白带过多等症。

甘草（甜草、甜根子、蜜草）

Glycyrrhiza uralensis Fisch.

【识别特征】豆科。多年生草本。根圆柱形，粗壮，皮红褐色或暗褐色，有甜味。茎直立，基部木质化。奇数羽状复叶，小叶7 ~ 17，卵形或宽卵形，两面有短毛和腺体。总状花序腋生，花冠蓝紫色或紫红色。荚果，条状长圆形，弯曲成镰刀状或环状，密生短毛。花果期7 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生向阳山坡沙质地。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味甘，平。清热解毒、祛痰止咳，补脾益气、调和诸药。用于咳嗽痰多，脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，痈肿毒疮等症。

望江南（野扁豆、金豆子、假决明）

Cassia occidentalis L.

【识别特征】豆科。一年生亚灌木草本。茎直立，上部分枝。偶数羽状复叶互生，小叶3 ~ 5对，卵形。伞房状总状花序，顶生或腋生。花瓣5，黄色。荚果，扁圆柱状条形。种子卵形。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】河北以南各地区。生山坡、荒地、河岸边等地。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味苦，寒，有小毒。清热明目、健脾、润肠。用于目赤肿痛，慢性便秘，伤食胃痛等症。

决明（草决明、决明子、假花生）

Cassia obtusifolia L.

【识别特征】豆科。一年生亚灌木草本。茎直立，上部分枝。偶数羽状复叶互生，小叶3对，倒卵形。花2朵生叶腋。花瓣5，黄色。荚果条形。种子近菱形，淡褐色，有光泽。花果期7 ～ 10月。

【分布生境】全国大部分地区有栽培。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味苦，甘，凉。清热明目、润肠通便。用于目赤肿痛，目暗不明，便秘，头痛眩晕等症。



胡卢巴（香草、苦豆、香苜蓿）

Teigonella foenum_graecum L.

【识别特征】豆科。一年生草本。茎直立。三出复叶，小叶倒卵形或卵状披针形。托叶卵形，全缘，基部与叶柄连合。花无梗，1 ~ 3朵生于叶腋。花萼筒状，萼齿披针形。花冠白色或淡黄色。荚果细长，扁圆筒形，直或稍弯。种子近椭圆形，黄褐色。花果期4 ~ 7月。

【分布生境】东北、华北、西北、西南等地。广为栽培。

【药用功效】种子入药，果实成熟时采集。性味苦，温。补肾阳、祛寒湿。用于肾虚腰酸，阳痿，小腹冷痛，肾脏虚冷，寒湿脚气，疝气等症。

膜荚黄芪（黄芪、东北黄芪）

Astragalus membranaceus (Fisch.)Bge.

【识别特征】豆科。多年生草本。主根长，粗壮，稍微木质化。茎直立，上部多分枝。奇数羽状复叶互生，小叶13 ~ 31，椭圆形、长椭圆形或长卵圆形，全缘。托叶条状披针形。总状花序腋生，花萼钟状。花冠黄色或淡黄色。荚果，膨胀，膜质，似刀形。种子肾形。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北、西南等地。生向阳山坡、草地、灌木丛、林缘等地。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味甘，温。滋肾补脾、止汗利水、消肿排脓、生肌。用于气虚乏力，自汗，盗汗，水肿，脱肛，子宫脱垂等症。同属蒙古黄芪*Astragalus mongholicus* Bge. Astrag.同等入药。

葛（葛藤、野葛、粉葛）

Pueraria lobata (Willd.) Ohwi

【识别特征】豆科。多年生藤本。地下块根肥厚。全株有黄褐色硬毛。三出羽状复叶，叶片菱状卵形，全缘。总状花序腋生。花冠紫红色。荚果扁条形，密生黄褐色硬毛。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】除新疆、西藏外，各地区有分布。生山坡、林缘。

【药用功效】根入药，秋季或冬季采集。性味甘，辛，凉。解表、开胃、除烦渴。用于发热头痛，身赤热，烦渴，麻疹不透，消化不良，尿涩痛等症。

苦参（地槐、苦骨、野槐）

Sophora flavescens Ait.

【识别特征】豆科。落叶亚灌木。根圆柱形，外皮黄色。奇数羽状复叶，小叶披针形，先端渐尖，基部圆形，叶背有伏毛。总状花序顶生，花黄白色。旗瓣匙形，无爪；翼瓣无耳。萼具5短齿。荚果，圆柱形，呈不规则的念珠状，先端有喙。种子近球形，褐色。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】全国各地。生山坡草地。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味苦，寒。清热，燥湿、杀虫。用于皮肤瘙痒，阴疮湿痒，热毒血痢，黄疸，小儿肺炎，急性扁桃体炎，痔漏，脱肛，赤白带下等症。

槐（槐米、白槐）

Sophora japonica L.

【识别特征】豆科。落叶乔木。羽状复叶，小叶7 ~ 15，卵状长圆形或卵状披针形，先端尖，基部圆形或宽楔形，叶背白粉。托叶镰刀形，早落。圆锥花序顶生，有柔毛。花黄白色，有短梗。花萼钟状。碟形花冠，旗瓣近圆形，先端微凹，基部具短爪。翼瓣与龙骨瓣近等长，同形，具2耳。荚果念珠状，果皮不裂。种子1 ~ 6枚，肾形，黑褐色。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分各地区有栽培。

【药用功效】花蕾、花及槐角入药，春、夏季采花蕾和花，初冬采角果。性味苦，微寒。凉血止血、清肝明目。由于便血，痔疮出血，血痢，吐血，崩漏，肝热目赤，头痛眩晕等症。

蒺藜（刺蒺藜、蒺藜子、白蒺藜）

Tribulus terrestris L.

【识别特征】蒺藜科。一年生草本。全株密被灰白色柔毛。茎由基部分枝，匍匐地面。偶数羽状复叶，对生或互生。小叶5 ~ 8对，长圆形，先端锐尖或钝，基部稍偏斜，全缘。托叶小，边缘半透明状膜质。花单生于叶腋，花瓣5，鲜黄色。分果，由5个分果瓣组成扁球形，每个分果瓣具刺，背面有硬毛和瘤状突起。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】全国大部分地区。生农田、果园、路边、荒地。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味苦，辛，温。活血祛风、平肝解郁、明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，风疹瘙痒等症。

芸香科

花椒（秦椒、蜀椒、点椒）

Zanthoxylum bungeanum Maxim.

【识别特征】芸香科。株体具扁三角形皮刺。奇数羽状复叶，小叶卵状披针形，叶柄基部具一对皮刺。聚伞状圆锥花序。花单性，花被片1轮。蓇葖果球形，红褐色，有瘤状突起。种子圆形，黑色，有光泽。花果期4～9月。

【分布生境】全国大部分地区。生平原、山坡、村寨或庭院中。

【药用功效】果皮入药，秋季采集。性味辛，温。温中散寒、除湿、健胃。用于风寒湿痹，积食，心腹冷痛，牙痛等症。

橘皮（陈皮、红橘、柑橘）

Citrus reticulata Blanco Fl.

【识别特征】芸香科。常绿小乔木。枝具刺。叶披针形或椭圆形，具半透明的油点。花单生或数朵生枝端和叶腋。花瓣5，白色或淡红色。柑果扁球形或球形，橙黄色等。花果期5～12月。

【分布生境】我国南方各地区。

【药用功效】果皮入药，随时收集。性味辛，苦，温。理气健胃、止咳化痰。用于咳嗽痰多，胸脘胀满等症。同属其他橘皮也可入药。

远志科

远志（细叶远志、草远志、山胡麻）

Polgyala tenuifolia Willd.

【识别特征】远志科。多年生草本。茎斜升或直立。叶互生，线形或线状披针形，全缘。总状花序，花淡蓝色或蓝紫色。花瓣3，中央1瓣呈龙骨瓣状。蒴果扁挛圆形，顶端凹陷。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草地。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味苦，辛，涩，温。安神益智、化痰、解郁。用于健忘，失眠，惊悸，咳嗽多痰等症。

西伯利亚远志（卵叶远志、阔叶远志、甜远志）

Polgyala sibirica L.

【识别特征】远志科。多年生草本。茎直立，被细柔毛。叶披针形或卵状披针形。总状花序顶生或腋生，花蓝紫色。花瓣3，下面中央1片龙骨瓣状，近顶端具流苏状的附属物。蒴果近倒心形，边缘翅状，有短睫毛。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】全国各地。生山坡草地。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味苦，辛，寒。滋阴清热、化痰、解毒。用于痨热咳嗽，风湿疼痛，腰酸等症。

大戟科

猩猩草（草本一品红、叶象花）

Euphorbia heterophylla L.

【识别特征】大戟科。茎直立。叶互生，叶型变化大，叶缘具波状齿或提琴开裂；上部叶猩红色。杯状聚伞花序，生茎顶，排成密集伞房花序。蒴果近球形。种子卵形，有瘤状突起。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】全草入药，全年可采集。性味苦，涩，寒，有毒。凉血调经、散瘀消肿。用于月经过多，跌打损伤等症。

飞扬草（大飞扬草、大乳汁草、九歪草）

Euphorbia hirta L.

【识别特征】大戟科。一年生草本。全株被粗毛。茎常呈红色。叶对生，卵状披针形，叶中央常有一紫色斑。杯状花序多数密集成腋生头状花序。蒴果，卵状三棱形。花果期全年。

【分布生境】我国南方各地。生农田、荒地、山坡等处。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，酸，凉。清热解毒、祛风止痒，通乳。用于肠炎痢疾，小便不通，皮肤瘙痒，产后少乳等症。

铁苋菜（海蚌含珠、血见愁、叶里藏珠）

Acalypha anstralis L.

【识别特征】大戟科。一年生草本。茎直立，多分枝。叶卵状披针形，叶脉具短毛。穗状花序，腋生，有总梗。雄花多数，生于花序的上部，带紫红色；雌花生于花序的基部，通常3花生于叶状苞片内，苞片三角状卵形，基部心形，边缘有锯齿，合时如蚌。蒴果近球形，有毛瘤状突起。种子卵形，灰褐色。花果期5～8月。

【分布生境】全国大部分地区。生农田、果园、荒地、路边。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，涩，平。清热解毒、利水消肿。用于肠炎，痢疾，便血，尿血，痈疔疮疡，湿疹等症。

蓖麻（红蓖麻、蓖麻子、大麻子）

Ricinus communis L.

【识别特征】大戟科。一年生草本。茎直立，具白粉。叶互生，盾圆形，掌状7 ~ 9深裂，叶缘有不规则锯齿。总状或圆锥花序顶生。蒴果球形，有刺，成熟时开裂。种子长圆形，有花纹。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味甘，辛，平，有毒。消肿拔毒、泻下通带。用于痈疽肿毒，大便燥结等症。

铁海棠（虎刺、麒麟刺）

Euphorbia milii Desmul.ex Boiss.

【识别特征】大戟科。多刺灌木。茎直立，灰褐色，刺钻形。叶互生，倒卵形。杯状聚伞花序，2～4枚生枝端，排列成二歧聚伞花序。苞片鲜红色。蒴果扁球形。室内花果期全年。

【分布生境】全国各地栽培。

【药用功效】全草入药，全年可采集。性味苦，涩，凉，有小毒。解毒、排脓，活血。用于痈疮肿毒等症。

鼠李科

酸枣（山枣、野枣、枣仁）

Ziziphus jujuba Mill.var.*spinosa* (Bge.) Hu ex H.f.Chow

【识别特征】鼠李科。多年生灌木或小乔木，枝条有尖刺。叶片椭圆状卵形，具细锯齿。花小，黄色，2～3朵簇生叶腋。核果近球形，熟时红褐色；果核近圆形。花果期5～9月。

【分布生境】长江以北各地区。生山坡、丘陵。

【药用功效】性味甘，酸，平。养心安神、镇静催眠、健脾。用于烦渴，失眠，盗汗，神经衰弱等症。

大枣（红枣、干枣）

Ziziphus jujuba Mill.

【识别特征】鼠李科。多年生灌木或小乔木，有条刺。叶片椭圆状卵形或卵状披针形，具细锯齿。花小，黄色，2 ~ 3朵簇生叶腋。核果长圆形，熟时红褐色；果核长圆形。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味甘，温。补中益气、养血安神。用于胃虚食少，脾弱便溏，气血不足等症。

枳椇（拐枣、鸡爪梨、枳椇子）

Hovenia dulcis Thunb.

【识别特征】鼠李科。落叶乔木。枝条红褐色，有皮孔。叶片广卵形或卵状椭圆形，叶缘有齿。复聚伞花序腋生或顶生。花小，黄色；花瓣倒卵形，两侧边缘内卷。浆果状核果球形，褐色；果柄肉质肥厚，扭曲状，红褐色。花果期6～10月。

【分布生境】西南、西北、中南、华东、华北等地。生山坡、沟边或公园。

【药用功效】种子及果柄入药，秋季采集。性味甘，平。清热利尿、健胃、补血。用于烦热口渴等症，润五脏，清肝火，解酒毒。

葡萄科

乌敛莓（五叶藤、母猪藤）

Cayratia japonica (Thunb.)Gagnep.

【识别特征】葡萄科。多年生蔓生草本。掌状复叶，小叶5，卵圆形。聚伞花序腋生或假腋生。花小，黄绿色，花瓣4，卵状三角形。浆果圆形。花果期6 ~ 8月。

【分布生境】南方各地。生旷野、林下。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，酸，寒。清热解毒、活血散瘀。用于咽喉肿痛，跌打损伤，毒蛇咬伤，痢疾，尿血，疔疮等症。

葎叶蛇葡萄（葎叶白蔹、小接骨草、活血丹）

Ampelopsis humulifolia Bge.

【识别特征】葡萄科。木质藤本。枝条红褐色。叶3 ~ 5掌状深裂，基部心形。聚伞花序与叶对生，花小，淡黄绿色。浆果球形，淡蓝紫色或浅黄色。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、河南、陕西等地。生山坡、沟谷、灌木丛。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味辛，热。消炎解毒、活血散瘀、祛风散湿、生肌骨。用于跌打损伤，骨折，关节炎等症。

爬山虎（地锦、爬墙虎、假葡萄藤）

Parthenocissus tricuspidata (Sieb.et Zucc.)Planch.

【识别特征】葡萄科。攀缘木质藤本。卷须短，多分枝，顶端有吸盘。叶宽卵形，3浅裂，基部心形，叶缘具粗锯齿。聚伞花序，与叶对生，花梗细长。花小，淡黄绿色。花瓣5，卵形。雄蕊5，与花瓣对生。浆果球形，浅黄色或淡蓝色。花果期5～9月。

【分布生境】全国各地广为栽培。

【药用功效】根、藤、果实入药，秋季采集。性味甘，涩，温。活血解毒、祛风通络。用于跌打损伤，痈疖毒肿，风湿关节痛等症。

野西瓜苗（小秋葵、打瓜花、山西瓜秧）

Hibiscus trionum L.

【识别特征】锦葵科。一年生草本。全株被细软毛。叶互生，3 ~ 5深裂，叶缘具羽状缺刻。花单生叶腋，浅黄白色。萼5裂，膜质，蒴果圆球形，有毛。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】安徽以北各地。生荒地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味甘，寒。清热祛湿、止咳。用于风热咳嗽，关节炎，烫伤等症。

苘麻（青麻、白麻、野苧麻）

Abutilon theophrasti Medic.

【识别特征】锦葵科。一年生草本。茎直立，上部分枝，株体具柔毛。叶互生，圆心形，先端尖，基部心形。花单生叶腋，黄色。蒴果半球形，分果瓣具喙，成熟时开裂。种子肾形，黑色。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】全国各地。生农田、果园、沟渠地边、荒地。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味苦，平。清热利湿、解毒。用于赤白痢疾，淋病涩痛，痈肿，目翳等症。



朱槿（扶桑、佛桑、大红花）

Hibiscus rosea-sinensis L.

【识别特征】锦葵科。多年生灌木。叶阔卵形，叶缘有齿。花单生叶腋，有单瓣、重瓣之分；花有不同颜色；花梗细长；雄蕊柱超出花冠。花期5 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生公园、庭院。

【药用功效】花、叶入药，花半开时采集。性味甘，平。清热解毒、清肺凉血。用于肺热咳嗽，尿路感染，白带等症。

木槿（白槿花、大碗花）

Hibiscus syriacus L.

【识别特征】锦葵科。叶卵形或菱状卵形，常3裂，裂缘缺刻状。花腋生，花瓣白色、红色、淡紫色等，常重瓣。雄蕊和柱头不伸出花冠。蒴果长圆形，具毛。花期5 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生公园、庭院。

【药用功效】花、叶入药，花半开时采集。性味苦，平。清热解毒。用于痢疾，腹泻，白带等症。

木芙蓉（地芙蓉、山芙蓉、芙蓉花）

Hibiscus mutabilis L.

【识别特征】锦葵科。落叶灌木或小乔木。株体密被星状毛和短柔毛。叶互生，卵状心形，5 ~ 7掌状分裂，边缘有钝齿；叶柄较长。花单生枝端叶腋处，花大，淡红色至深红色，多为重瓣花，基部与雄蕊柱合生。小苞片线形；花萼钟形，裂片卵形。瘦果近扁球形，密生短棉毛，果瓣5。种子多数，肾形，背部有毛。花果期8 ~ 11月。

【分布生境】陕西、江苏、江西、福建、河南、湖北、广东、四川、贵州等地。生山坡、公园、庭院等地。广为栽培。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，微苦，凉。清热解毒、凉血止血、消肿排脓。用于肺热咳嗽，目赤肿痛。

梧桐科

梧桐（桐树、青桐、梧桐子）

Firmiana simplex (L.) Wright

【识别特征】梧桐科。落叶乔木。树皮光滑，青绿色。叶掌状3～5裂，裂片全缘，基部心形。圆锥花序顶生，花黄绿色。萼片长圆形，花瓣状。蓇葖果，心皮4～5，开裂成叶状。种子球形，生于心皮边缘。

【分布生境】华北以南各地区有栽培。

【药用功效】花、种子、叶、根、树皮均可入药。6月采花；9月采种子；叶、根随时可采。花、种子性味甘，平。根、叶性味苦，凉。叶片，清热解毒。种子，健脾消滞。根除风祛湿。用于水肿，烫伤、伤食腹泻，风湿骨痛，痈疮肿毒等症。

仙人掌（观音掌、神仙掌、霸王）

Opuntia dillenii (Ker.-Gaw.) Haw.

【识别特征】仙人掌科。多年生肉质灌木。茎节倒卵形，扁平，幼时鲜绿色，老时蓝绿色；茎上针刺黄色。花单生或数聚朵于茎节顶部边缘，花鲜黄色；花托狭倒卵形，具刺。浆果肉质多汁，倒卵形或梨形，成熟时紫红色或红色，有刺毛。花果期6～12月。

【分布生境】南方各地区。生山坡、田地边、路边、荒地，海滨沙滩地。广为栽培，供观赏。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味苦，寒。清热解毒、行气活血、凉血止血、消肿。用于心胃气痛，痢疾，痔血，咳嗽，咽喉痛，疔疮等症。

胡颓子科

沙棘（醋柳、沙棘果、酸刺）

Hippophae rhamnoides L.

【识别特征】胡颓子科。落叶灌木或小乔木。具粗棘刺，枝幼时密被褐锈色鳞片。叶互生，条状披针形，叶背具白色鳞片。雌雄异株。短总状花序腋生于小枝上。花小，淡黄色；花被筒囊状。果肉质，近球形，橙黄色。花果期4 ~ 10月。

【分布生境】华北、西北、四川、云南、西藏等地。生山坡、沟谷、灌丛中。广为栽培。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味酸，温。健胃补脾、活血散瘀、祛痰止咳，降血压，降血脂。用于消化不良，咳嗽痰多，瘀肿，跌打损伤等症。

石榴（鸡矢果、缅桃、番桃）

Psidium guajve L.

【识别特征】石榴科。灌木或小乔木。叶对生，革质，椭圆形或长圆形，全缘，羽状脉。花单生或2 ~ 3朵腋生，花白色，花瓣4 ~ 5，芳香。浆果球形、卵圆形或梨形，成熟时淡红色，先端有宿存萼片；果肉白色或黄色。花果期5 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生庭院、村寨、丘陵地。广为栽培。

【药用功效】果皮入药，秋季采集。性味甘，涩，平。收敛止泻、止血、驱虫。用于痢疾，急性肠炎，痈疮，疥癣，小儿消化不良等症。

野牡丹科

野牡丹（山石榴、猪姆草、高脚山落苏）

Melastoma camdidum D.Don

【识别特征】野牡丹科。常绿灌木。株体被鳞片状糙毛。叶对生，阔卵形，全缘，主脉5 ~ 7条。伞房花序，生枝顶端。花瓣玫瑰色或粉红色，倒卵形，先端圆形，基部楔形。雄蕊5长5短。子房半下位，5室，先端具一圈刚毛。蒴果稍肉质，坛状球形。密被鳞片状糙毛。花果期5 ~ 12月。

【分布生境】广东、广西、福建、西南等地。栽培观赏。

【药用功效】全草入药，秋季采集。性味酸，涩，凉。清热解毒、活血消肿。用于跌打损伤，外伤出血，肝炎，食积，泻痢，月经过多，乳汁不下等症。

刺五加（五加皮、一百针、刺拐棒）

Acanthopanax senticosus (Rupr.et Maxim.) Harms

【识别特征】五加科。多年生灌木。一或二年生枝密生细长的针状刺。掌状复叶具5小叶。伞形花序单个顶生，或2～6个组成稀疏的圆锥花序。花紫黄色。果实近球形，具5棱，黑色。花果期6～9月。

【分布生境】东北、河北、山西等地。生山坡杂木林或灌丛中。

【药用功效】根、茎皮入药，春季或秋季采集。性味辛，微苦，温。刺五加皮祛风湿、壮筋骨、活血祛瘀、安神益气。用于体虚乏力，食欲不振，风湿性关节炎，腰腿痛，失眠多梦等症。

人参（棒棰、地精、孩儿参）

Panax ginseng C. A Mey

【识别特征】五加科。多年生草本。主根肥大肉质，常分歧，淡黄棕色。茎直立。掌状复叶轮生于茎端；一年生者有1枚三出复叶，二年生者有1枚五出掌状复叶，三年生者有2枚五出掌状复叶，最后增至6枚五出掌状复叶。总花梗由茎端叶柄中间抽出。伞形花序顶生，花小，淡黄绿色，花瓣5，先端尖。浆果状核果，肾形或扁球形，成熟时鲜红色，每室含种子1枚。花果期6～9月。

【分布生境】吉林、辽宁、黑龙江、河北北部。生深山茂密林阴下。现多为人工栽培。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味甘，微苦，温。大补元气、固脱生津、安神。用于气血津液不足，体虚欲脱，心力衰竭，惊悸失眠，健忘，眩晕头痛，肺虚喘咳，脾虚食少，津伤口渴，肢冷脉微，大便滑泻，尿频，阳痿，宫冷，崩漏等症。

三七（田七、人参三七、金不换）

Panax pseudo-ginseng Wall.var.*notoginseng* (Burkill) Hoo & Tseng

【识别特征】五加科。多年生草本。主根粗壮，圆锥形或不规则块状，灰黑色等。茎直立。掌状复叶，具长柄，3 ~ 6枚轮生于茎端，小叶3 ~ 7片，中间1片最大，椭圆形或长圆状倒卵形，边缘有细锯齿。总花梗从茎端叶柄中央伸出，伞形花序单个顶生；花小，淡黄绿色，花瓣5；花萼通常5齿裂；雄蕊5。核果浆果状，近于肾形，成熟时红色。种子1 ~ 3粒，扁球形。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】主产西南部地区。生山坡林阴下。多为人工栽培。

【药用功效】根入药，夏末秋季或冬季采集。性味甘，微苦，温。散瘀止血、消肿定痛。用于跌仆瘀血，外伤出血，痈肿疼痛，咯血，吐血，便血，崩漏等症。

柴胡（北柴胡、硬叶柴胡）

Bupleurum chinense DC.

【识别特征】伞形科。多年生草本。主根粗大，分枝。茎单一或丛生，上部多分枝，微呈“之”字形弯曲。基生叶倒披针形或狭椭圆形。茎生叶倒披针形或宽线状披针形。复伞形花序多数，花鲜黄色。双悬果椭圆形，棱狭翅状，棕色。花果期7～9月。

【分布生境】东北、华北、西北、华东及河南、湖北、四川。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味苦，微寒。疏散退热、升阳舒肝。用于感冒发烧，寒热往来，肝郁气滞，胸胁胀痛，疟疾，脱肛，子宫下垂，月经不调等症。

防风（东防风、关防风）

Saposhnikovis divaricata (Turcz.)Schischk.

【识别特征】伞形科。多年生草本。主根粗壮，圆锥形。茎直立，二歧分枝。基生叶2 ~ 3回羽状分裂，终裂片披针形。茎上部叶小，具扩展叶鞘。复伞形花序，无总苞片。伞辐5 ~ 10，不等长，小总苞片4 ~ 6，披针形。花瓣白色。双悬果，侧棱具翅，被小瘤状突起。花果期7 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草地，沟谷。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味甘，辛，温。解表祛风、防湿止痛。用于感冒头痛，风湿痹痛，破伤风，四肢拘挛，风疹瘙痒等症。

白芷（兴安白芷、达乌里当归、河北独活）

Angelica dahurica (Fisch.)Benth

【识别特征】伞形科。多年生草本。主根粗壮，圆锥形。茎直立，常呈紫红色，上部分枝。基生叶2～3回羽状分裂，终裂片卵形至长卵形；叶柄基部鞘状抱茎。茎上部叶简化，具扩展叶鞘。复伞形花序，花瓣白色，倒卵形。双悬果，椭圆形，侧棱具宽翅。花果期7～9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草地，沟谷。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味辛，温。散风除湿、消肿、止痛。用于感冒头痛，牙痛，寒湿腹痛，鼻塞，痈疽疮疡，皮肤瘙痒等症。

连翘（黄花条、落翘、空翘）

Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl.

【识别特征】木犀科。多年生落叶灌木。枝条直立或下垂，小枝褐色，稍四棱。叶对生，卵形或椭圆状卵形，叶缘有细齿。花先叶开放。花单生于叶腋。花萼绿色，裂片4，边缘具睫毛。花冠鲜黄色，裂片4。雄蕊2，着生在花冠筒基部；柱头2裂。蒴果卵圆形，表面散生瘤点。花果期3～8月。

【分布生境】我国中部以北各地。生山野、公园。广为栽培。

【药用功效】果实入药，夏、秋季采集。性味苦，微寒。清热解毒、消肿散结。用于风热感冒，温病初起，高热烦渴，痈疽，丹毒，喉痹等症。

龙胆科

秦艽（大叶秦艽、大叶龙胆）

Gentiana macrophylla Pall.

【识别特征】龙胆科。多年生草本。茎圆柱形，斜生或直立。基生叶，披针形或长圆状披针形，具5脉。茎生叶稍小，3～4对，对生，基部连合。花生于上部叶腋，成轮状丛生。花萼膜质。花冠筒状，篮紫色，先端5裂，卵圆形。子房长，无柄，花柱短。蒴果，长圆形。种子椭圆形，褐色，有光泽。花果期7～10月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草甸。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味辛，苦，平。散风除湿、清热利尿、舒筋止痛。用于风湿痹痛，骨节烦痛，筋脉拘挛，黄疸，便血，小儿疳热等症。

夹竹桃科

长春花（雁来红、日日新、四时春）

Catharanthus roseus (L.)G.Don

【识别特征】夹竹桃科。多年生草本或半灌木。对生，倒卵状长圆形，中脉白色。聚伞花序，花冠粉红色，高脚碟状，裂片5，倒卵形，蓇葖果2，圆柱形。花果期全年。

【分布生境】华东、华中、西南等地。广为栽培，供观赏。

【药用功效】全草入药，随时采集。性味苦，凉。镇静安神、凉血降压、抗癌。用于白血病，淋巴肉瘤，高血压等症。

罗布麻（草夹竹桃、茶叶花、泽漆麻）

Apocynum venetum L.

【识别特征】夹竹桃科。半灌木。茎直立，多分枝。叶对生，长圆状披针形。聚伞花序顶生，花冠粉红色，先端5裂。蓇葖果，双生，下垂。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】东北、华北、西北。生河滩、沟渠边、沙质地。

【药用功效】全草入药，夏季采集。性味甘，苦，凉。平肝安神、清热利水。用于高血压，神经衰弱，肝阳眩晕，心悸失眠，肾炎浮肿等症。



旋花科

海红薯（二叶红薯、马鞍藤、厚藤）

Ipomoea pes-caprae(L.) Sweet

【识别特征】旋花科。多年生蔓生草质藤本。茎匍匐，叶互生，广椭圆形或圆形，先端2裂，全缘。聚伞花序腋生，花冠漏斗状，粉红色或白色。蒴果卵圆形，花果期夏、秋季。

【分布生境】华南等地。生海滩、荒地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，苦，寒。祛风除湿、消痈散结。用于风湿脾痛，痈肿疔毒，乳痈，痔漏等症。

牵牛（喇叭花、牵牛子、黑丑）

Pharbitis hederacea (L.) Choisy

【识别特征】旋花科。一年生草本。茎缠绕，分枝。叶心状卵形，3裂。花序有花1 ~ 3朵，腋生。花冠漏斗状，蓝紫色、紫红色或白色。蒴果球形。种子黑褐色，三棱形。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生田野、灌丛。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味苦，寒，有毒。利水通便、祛痰、杀虫。用于水肿胀满，痰饮积聚，二便不通，蛔虫病，蛲虫病等症。同属植物圆叶牵牛同等入药。

菟丝子（豆寄生、黄丝、黄藤子）

Cuscuta chinensis Lam.

【识别特征】旋花科。一年生寄生草本。茎细长缠绕，黄色，无叶片。花多数簇生。苞片和小苞片鳞片状，花萼杯状，5裂。花冠白色，先端5裂。蒴果扁球形，被花冠所包。种子卵形，淡褐色。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生豆地、山坡、荒地等处。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味甘，温。滋补肝肾、益精壮阳、止泻。用于阳痿遗精，腰膝酸软，目昏耳鸣，胎动不安等症。同属植物南方菟丝子和日本菟丝子同等入药。

黄花列当（列当、草苁蓉、独根草）

Orobanche pycnostachya Hance

【识别特征】列当科。一年生寄生草本。株体密被细毛。茎直立，圆柱形，基部膨大，黄褐色。叶片鳞片状，卵形。穗状花序，密生腺毛。花冠淡黄色。蒴果卵状椭圆形。种子扁球形，黑色。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草地、沙丘地，多寄生在菊科植物的根上。

【药用功效】全草入药，5 ~ 6月采集。性味甘，温。固肾助阳、强筋骨。用于肾虚腰膝冷痛，阳痿遗精，神经官能症等。同属植物列当 *Orobanche coerulescens* Steph. 同等入药。

马缨丹（五色梅、臭草、如意花）

Lantana camara L.

【识别特征】马鞭草科。灌木。茎四棱，具倒钩刺。叶对生，卵形，叶缘有锯齿。头状花序腋生。花红色、橙色、粉红色、黄色等。果实球形，熟时紫黑色。花果期全年。

【分布生境】华南、西南等地。生山坡、荒地、路边等处。栽培供观赏。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味辛，苦，凉，有毒。清热解毒、祛风止痒。用于感冒，腮腺炎，瘙痒等症。

马鞭草（风颈草、紫顶龙牙、狗牙草）

Verbena officinalis L.

【识别特征】马鞭草科。多年生草本。茎生叶多数为3深裂，裂片边缘有不整齐的锯齿。穗状花序，花小，淡蓝紫色。蒴果长方形，成熟时分裂为4个小坚果。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】南方各地。田野、山坡、路边等处。

【药用功效】全草入药，6 ~ 8月采集。性味苦，寒。清热解毒、利湿消肿。用于经闭，痛经，流感高热，肾炎水肿，尿路结石等症。

假马鞭草（假败酱、大兰草、玉龙鞭）

Stachytarpheta jamaicensis (L.)Vahl.

【识别特征】马鞭草科。多年生草本。茎四棱形。叶对生，卵圆形，边缘具锯齿。穗状花序顶生。花单生苞腋内，花冠深蓝紫色，先端5裂。果包于膜质的花萼内，熟时裂成2分果。花果期6 ~ 12月。

【分布生境】华南、西南等地。生荒地。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味苦，寒。清热解毒、利水消肿。用于尿路结石，尿路感染，风湿筋骨痛，痈疖肿痛等症。

牡荆（荆条果、牡荆子）

Vitex negundo L.var.*cannabifolia*(Sieb.Zucc.) Hand.-Mazz.

【识别特征】马鞭草科。落叶灌木或小乔木。茎四棱形。叶对生，掌状复叶5片，小叶披针形。边缘具锯齿。圆锥花序顶生，花冠淡紫色。果实球形，黑灰色。花果期7～9月。

【分布生境】南方。生山坡、荒地。

【药用功效】果实入药，果熟时采集。性味微苦，温。祛风化痰、下气、止痛。用于咳嗽哮喘，胃痛，疝气，妇女白带等症。

黄芩（空心草、黄金茶）

Scutellaria baicalensis Georgi

【识别特征】唇形科。多年生草本。主根圆锥形。叶条状披针形。总状花序顶生，花偏生花序一侧。花冠紫色、紫红色至蓝紫色。小坚果卵球形，黑色。花果期7 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北等地。生山坡、丘陵草地。广为栽培。

【药用功效】根入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。除湿热、泄实火、止血，安胎。用于肺热咳嗽，目赤肿痛，胎动不安等症。

藿香（大叶薄荷、土藿香、排香草）

Agastache rugosa (Fisch.et Mey.) O. Ktze.

【识别特征】唇形科。茎四棱，分枝。叶对生，心状卵形，边缘具齿。轮伞花序组成穗状花序。花冠淡紫色或红色。小坚果，卵状长圆形，顶端有毛。花果期6 ~ 11月。

【分布生境】全国各地。生山坡、沟谷。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，微温。祛暑解表、化湿和胃。用于暑湿感冒，腹痛吐泻，胸闷等症。

裂叶荆芥（荆芥、四棱杆蒿、假苏）

Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq.

【识别特征】唇形科。一年生草本。茎多分枝，密被短柔毛。叶对生，常3～5全裂，小裂片条形或披针状条形，全缘，两面被柔毛，下面具黄色腺点。由多数的轮伞花序组成顶生的穗状花序。苞片叶状；小苞片线状。花萼管状钟形，萼齿5，披针形或三角状披针形。花冠青紫色，外面被柔毛，二唇形。小坚果，长圆状三角形，褐色，具小点。花果期7～10月。

【分布生境】华北、西北等地。生山坡、丘陵荒地。广为栽培。

【药用功效】全草入药，夏、秋季花开到顶穗绿时采集。性味辛，微温。散风解表、透疹。用于风寒感冒，发烧，头痛，咽喉肿痛，风疹，麻疹，吐血，痈肿等症。

活血丹（连钱草、金钱草、透骨消）

Glechoma longtuba (Nakai) Kupr.

【识别特征】唇形科。多年生草本。茎匍匐。叶圆心形，叶缘具圆齿。轮伞花序含2 ~ 5花。花冠淡紫色，下唇具深色斑点。小坚果长圆状卵形，褐色。花果期4 ~ 7月。

【分布生境】全国大部分地区。生湿润地、草地、路边。

【药用功效】全草入药，夏季采集。性味苦，凉。清热解毒、利尿消肿、镇咳。用于膀胱结石，尿路结石等症。

益母草（红花益母草、月母草、茺蔚子）

Leonurus japonicus Houtt.

【识别特征】唇形科。一年至二年生草本。叶阔卵形，分裂成掌状3裂深裂；花序上的叶不分裂。轮伞花序腋生，花冠淡紫色。果长圆状三棱形，淡褐色。花果期7～10月。

【分布生境】全国各地区。生荒地、山坡、路边、农田、果园。

【药用功效】全草入药，夏季采集。性味辛，苦，凉。活血祛瘀、调经消水。用于月经不调，痛经，经闭，瘀血腹痛，水肿尿少，急性肾炎水肿等症。

薄荷（野薄荷、水薄荷、蕃荷菜）

Mentha haplocalyx Briq.

【识别特征】唇形科。多年生草本。茎直立。叶片卵状披针形，叶缘具齿。轮伞花序叶腋簇生，花冠淡紫色。小坚果长圆形，黄褐色。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地区。生沟渠边、水田边及湿润地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，凉。解表发汗、清咽利喉、消暑解毒、透疹止毒。用于感冒，目赤，头痛，咽喉肿痛，口疮等症。

罗勒（九层塔、香佩兰、兰香）

Ocimum basilicum L.

【识别特征】唇形科。一年生草本。茎常紫色。叶片卵形。轮伞花序含6花，总状花序，花冠淡紫白色。小坚果，长圆形。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生农田及荒地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，温。疏风行气、化湿消食。用于风寒感冒，肠胃胀气，腹泻，风湿痹痛等症。

紫苏（白紫苏、苏子、苏麻）

Perilla frutescens (L.) Britt.

【识别特征】唇形科。一年生草本。叶片宽卵形，叶缘具粗齿。轮伞花序组成偏向一侧的顶生或腋生的总状花序。花白色或紫红色，上唇微缺，下唇3裂。小坚果球形，表面具网纹。花果期8 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生农田、路边、村寨旁及庭院。

【药用功效】全草入药，秋季采集。性味辛，温。解毒散寒、理气化痰、安胎润肠，理气安胎。用于风寒感冒，咳嗽，头痛，妊娠呕吐，鱼蟹中毒等症。

丹参（紫丹参、赤参、红根）

Salvia miltiorrhiza Bge.

【识别特征】唇形科。多年生草本。根肥厚肉质，表皮棕红色。茎四棱形，具槽，密被长柔毛。叶为奇数羽状复叶，小叶3～5枚，卵形或椭圆状卵形，两面有毛。轮伞花序组成顶生或腋生的总状花序，密被腺毛或和长毛；苞片披针形。花萼钟形，紫色，具11条脉，外被腺毛，二唇形。花冠蓝紫色，上唇镰刀形；下唇短于上唇，3裂，中间裂片最大。小坚果椭圆形，黑色。花果期4～8月。

【分布生境】东北、华北、华东等地。生山坡、林缘、荒地。

【药用功效】根入药，春、秋季采集。性味苦，微寒。通经活血、祛瘀止血、清心除烦。用于冠心病，胸腹刺痛，心绞痛，肝脾肿大，月经不调，痛经，疮疡肿痛等症。

茄科

龙葵（天茄苗儿、天天茄、黑茄）

Solanum nigrum L.

【识别特征】茄科。一年生草本。叶卵形，全缘或具波状齿。蝎尾状花序，腋外生，由数朵花组成。花冠白色，5深裂。浆果球形，成熟时黑色。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地。生荒地、农田。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。清热解毒、活血消肿。用于慢性气管炎，咳嗽，痈肿，疔疮，丹毒，急性肾炎等症。



天仙子（莨菪子、山大烟、牙痛子）

Hyoscyamus niger L.

【识别特征】茄科。一或二年生草本。株体被毛。叶片长圆形，叶缘浅裂或深裂。花单生叶腋。花冠漏斗形，黄绿色，具紫色纹脉。蒴果卵球形，包于花萼内。种子扁卵形淡黄棕色。花果期6～9月。

【分布生境】华北、华东、西北等地。生山坡、田野等地。

【药用功效】种子入药，夏、秋季采集。性味辛，苦，温，有大毒。镇痉镇痛。用于胃痉挛疼痛，喘咳，胃痛，牙痛，风痹厥痛，痈肿等症。

洋金花（白花曼陀罗、南洋金花、山茄子）

Datura metel L.

【识别特征】茄科。一年生草本或亚灌木。叶互生或茎上部叶假对生，卵形或宽卵形，先端尖，基部为不对称的楔形，叶缘具不规则的短齿或浅裂，或全缘而波状。花单生，花冠漏斗形，白色，檐部5裂，裂片顶端具小白尖。蒴果扁球形，疏生短硬刺，成熟后不规则开裂，花果期4 ~ 8月。

【分布生境】华中以南各地区。生荒野、沟渠路边。

【药用功效】花入药，花初开放时采集。性味辛，温，有毒。平喘止咳、镇痛，解痉。用于哮喘咳嗽，风湿痹痛，脘腹冷痛等症。并作外科麻醉剂。

枸杞（地骨皮、枸杞子、枸杞头）

Lycium chinense Mill.

【识别特征】茄科。多年生灌木。叶片卵状披针形，全缘。花常1～5朵簇生叶腋。花萼通常3中裂或4～5齿裂；花冠淡紫色，5深裂，裂片边缘有缘毛。浆果卵形或长圆形，红色。种子扁肾脏形，黄色。花果期6～10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡、路边、灌木丛中。广为栽培。

【药用功效】果实、叶、根入药，夏、秋季采集。性味甘，平。滋补肝肾、益精明目。用于肝肾阴亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，内热消渴，目昏不明等症。

地黄（苄、干地黄、酒壶花）

Rehmannia glutinosa (Gaertn.)Libosch.

【识别特征】玄参科。多年生草本。全株密被柔毛及腺毛。根状茎肉质肥厚，黄色。基生叶倒卵形或长椭圆形，叶面皱纹。总状花序顶生，花冠钟状，紫红色，内面有黄色带紫色的条纹。蒴果近球形。种子卵形，黑褐色，表面有蜂窝状网眼。花果期4 ~ 8月。

【分布生境】安徽以北地区。生山坡、路边、荒地。

【药用功效】块根入药，秋季采集。生地黄性味甘，寒。清热凉血、养阴生津。用于热病烦渴，阴虚内热，发斑发疹，吐血，糖尿病等症。熟地黄性味甘，微温。滋阴补血、益精填髓。用于腰膝酸软，肝肾阴虚，盗汗遗精，月经不调，血虚萎黄，内热消渴，眩晕，心悸，耳鸣，须发早白等症。

冰糖草（野干草、土干草、万粒珠）

Scoparia dulcis L.

【识别特征】玄参科。多年生草本。茎有棱，多分枝。叶对生或轮生，卵状披针形，全缘或前半部有锯齿。花单朵或成对生于叶腋。花冠小，白色，喉部生有密毛，花瓣4。雄蕊4，近等长，花药箭形。蒴果卵圆形或球形，成熟时开裂。花果期6 ~ 11月。

【分布生境】华南、西南等地。生村旁、路边、坡坎、沟边等湿润地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味甘，凉。清热利湿、疏风止咳。用于感冒发烧，肺热咳嗽，肠炎腹泻，小便不利，脚气水肿，肝炎，丹毒等症。

毛泡桐（紫花桐、冈桐、日本泡桐）

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

【识别特征】玄参科。落叶乔木。树皮灰褐色，小枝有明显皮孔，常被黏质短柔毛。叶卵状心形，全缘或波状浅裂。花序圆锥形，花萼浅钟形，5深裂；花冠紫色，漏斗状钟形。子房卵圆形，有腺毛。蒴果卵圆形，幼时密被黏质腺毛，果皮厚，宿萼不反卷。花果期4 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、华东、华中、西南等地。生路边、庭院、公园、山坡等处。

【药用功效】根皮、木、叶、花、果实入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。消炎、止咳、利尿、降血压。用于痈疽，疔疮，创伤出血等症。同属植物泡桐 *Paulownia fortumei* (Seem.) Hemsl. 同等入药。

车前（车轱辘菜、车前子）

Plantago asiatica L.

【识别特征】车前科。多年生草本。叶片椭圆形，宽卵形或卵状披针形，叶近全缘、波状或具疏齿，具5～7条弧形脉；叶柄较长，基部扩大成鞘状。穗状花序生莛顶，花浅白色。花冠干膜质。雄蕊4，着生于花冠筒上。子房2室，花柱丝状，宿存。蒴果卵状圆锥形，周裂。种子长圆形，4～8粒。花果期6～10月。

【分布生境】全国大部分地区。生农田、果园、荒地、沟渠旁、河岸边。

【药用功效】种子及全草入药，夏、秋季采集。性味甘，寒。清热利尿、清肝明目。用于水肿胀满，热淋涩痛，目赤肿痛，痰热咳嗽等症。同属植物平车前*Plantago depressa* Willd.同等入药。

茜草科

耳草（鲫鱼胆草、苦胆草）

Oldenlandia auricularia (L.) F.-Muell.

【识别特征】茜草科。多年生草本。株体密被短柔毛。叶对生，卵状披针形。托叶合生成短鞘。聚伞花序腋生，集成头状。花冠白色。雄蕊生于花冠喉部。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】华南、西南等地。生草地。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味苦，凉。清热解毒、散瘀消肿。用于发烧感冒，咽痛咳嗽，肠炎痢疾，蛇虫咬伤等症。

茜草（红茜、四轮藤、风车草）

Rubia cordifolia L.

【识别特征】茜草科。多年生攀缘草本。茎四棱，多分枝。株体密生倒刺。叶4片轮生，卵形或卵状披针形，基部心形。聚伞花序顶生或腋生。花冠淡黄白色。浆果双头形，肉质，熟时红色。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】我国大部分地区。生山坡、灌丛、果园等地。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味苦，酸，微寒。通经活络、化瘀。用于尿血，吐血，经闭，劳伤骨痛，跌打瘀肿等症。

忍冬科

金银花（忍冬、双花、鹭鸶花）

Lonicera japonica Thunb.

【识别特征】忍冬科。多年生攀缘灌木。枝条密生柔毛。叶片卵形或椭圆状卵形。花着生叶腋，花冠二唇形，花白色及黄色，有香味，密被短柔毛；花筒与裂片近等长。浆果离生，球形，黑色。花果期5 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生丘陵、山谷、庭院及公园。广为栽培。

【药用功效】花蕾及初开的花朵，夏季采集。性味甘，寒。清热解毒、消炎消肿。适用于风热感冒，温病发热，热毒血痢，痈肿疔疮，丹毒，炎症，咽喉疼痛，暑热等症。

冬瓜（白瓜、冬瓜皮、冬瓜子）

Benincasa hispida (Thunb.)Cogn.

【识别特征】葫芦科。一年生蔓生草本。叶片5～7浅裂至中裂。花单生，花冠黄色。瓠果，长圆形至扁球形，表面具白霜和刺毛。种子卵形，白黄色。花果期6～10月。

【分布生境】全国各地栽培。

【药用功效】果皮及种子入药，随时采集。果皮性味甘，凉。清热利尿、消肿。用于小便不利，水肿胀满，暑热口渴等症。种子性味甘，凉。清热化痰、消痈排脓。用于痰热咳嗽，肺痈，水肿，脚气，痔疮等症。

苦瓜（凉瓜、癞瓜）

Momordica charantia L.

【识别特征】葫芦科。一年生攀缘草本。叶片5 ~ 7深裂，叶缘具裂齿。花单生，黄色，花梗长。花冠5深裂。果实纺锤形，密生疣状突起。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】全国普遍栽培。

【药用功效】果实入药，随时采集。性味苦，寒。清热解毒、消暑、明目。用于暑热烦渴，目赤疼痛，疮痈肿毒等症。

栝楼（瓜蒌、天瓜、天花粉）

Trichosanthes kirilowii Maxim.

【识别特征】葫芦科。多年生攀缘草本。块根肥厚。茎多分枝。叶片常3 ~ 7中裂，叶缘有较大的疏齿或缺刻状。花冠白色，5深裂，裂片先端具分裂成流苏状。果实椭圆形或球形，成熟时黄褐色。种子扁椭圆形，黑褐色。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡草丛、林边。广为栽培。

【药用功效】根、果实、种子入药，秋季采集。根称天花粉，性味甘，苦，酸，凉。生津止渴、消肿排脓。用于热病口渴，肺燥咳血，痈肿等症。果实性味甘，苦，寒。润肺、化痰、散结，滑肠。用于肺热咳嗽，胸痹心痛，便秘，肺痈等症。种子性味甘，寒。润肺、化痰、滑肠。用于肺热咳嗽，便秘，痈肿等症。

桔梗科

党参（黄参、狮头参）

Codonopsis pilosula(Franch.) Nannf.

【识别特征】桔梗科。多年生草本。根肉质。叶互生或对生，卵形。花生分枝顶端。花冠宽钟状，先端5浅裂。花果期7～9月。

【分布生境】东北、华北、西南等地。生山坡灌丛、林缘中。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味甘，平。补中益气、健脾益肺。用于贫血，气短心悸，头晕，消渴，脾胃虚弱，便溏等症。

羊乳（四叶参、山萝卜、山海螺）

Codonopsis lanceolata (S.et Z.)Trautv.

【识别特征】桔梗科。多年生草本。根肉质肥大。叶4枚簇生成假轮生。花冠宽钟状，先端5浅裂。花果期7 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、华中等地。生山地灌丛及林缘中。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味甘，平。具解毒排脓、补虚催乳等功效。用于肺痈，乳痈，肠痈，肿毒，乳少等症。

桔梗（山铃铛花、和尚帽、白药）

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

【识别特征】桔梗科。多年生草本。根粗壮肉质。叶3枚轮生，卵状披针形。花单生茎顶。花冠蓝紫色，5浅裂。蒴果倒卵形，成熟时顶端5瓣裂。种子卵形，具三棱，黑褐色，有光泽。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山地草丛。

【药用功效】根入药，秋季采集。性味苦，辛，平。宣肺气、祛痰排脓。用于咳嗽痰多，咽喉肿痛，肺痈吐脓，痢疾腹痛等症。

艾蒿（艾叶、五月艾）

Artemisia argyi Levl.et Vant.

【识别特征】菊科。多年生草本。茎直立，被柔毛。叶互生，3 ~ 5深裂或羽状深裂，叶缘具粗齿。头状花序多数，花淡黄色，全为管状花。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生荒地、山坡、路边。

【药用功效】叶或全草入药，夏季采集。性味辛，苦，温。散寒止痛、温经、止血。用于吐血，便血，月经不调，胎动不安，肠炎，痢疾，皮肤瘙痒等症。

茵陈蒿（茵陈、绒蒿、细叶青蒿）

Artemisia capillaris Thunb.

【识别特征】菊科。多年生草本。叶1～3回羽状深裂，被短绢毛。茎生叶细如毛发状。头状花序多数；总苞球形，总苞片3～4层，卵形，花黄色。瘦果长圆形。花果期8～10月。

【分布生境】全国各地。生田野、山坡。

【药用功效】全草入药，3～4月采集。性味苦，辛，凉。清热利湿退黄。用于湿热黄疸，小便不利，皮肤瘙痒，疮疥等症。

牛蒡（蒡翁菜、牛蒡子、大力子）

Arctium lappa L.

【识别特征】菊科。二年生草本。根肉质粗壮。基生叶丛生，阔卵圆形。茎生叶宽卵形或心形。头状花序排列成伞房状。管状花紫红色；总苞球形，总苞片针状，先端成钩刺。瘦果长椭圆形，具棱，灰褐色，冠毛短刚毛状。花果期6～8月。

【分布生境】长江以北等地区。生山坡、沟谷、村寨旁及荒地。

【药用功效】瘦果入药，秋季采集。性味甘，寒。散风热、消肿毒。用于风热感冒，咳嗽，麻疹风疹，咽喉肿痛等症。

三叶鬼针草（鬼针草、疏柔毛鬼针草）

Bidens pilosa L.

【识别特征】菊科。一年生草本。叶一回羽状复叶，小叶3～7枚，卵状椭圆形。头状花序，舌状花白色，管状花黄色。瘦果线形，顶端芒刺3～4枚，具倒刺毛。花果期8～9月。

【分布生境】南方各地区。生农田、荒地。

【药用功效】全草入药，开花前采集。性味甘，淡，微寒。清热解毒、活血散瘀。用于感冒，咽喉肿痛，发烧，跌打扭伤等症。

鬼针草（婆婆针）

Bidens bipinnata L.

【识别特征】菊科。一年生草本。叶二回羽状深裂，小裂片三角形或菱状披针形，舌状花1 ~ 3朵，黄色；管状花黄色，5齿裂。瘦果线形，顶端芒刺3 ~ 4枚，具倒刺毛。花果期8 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生荒地、山坡、路边。

【药用功效】全草入药，开花前采集。性味甘，淡，微寒。清热解毒、活血散瘀。用于感冒，咽喉肿痛，发烧，跌打扭伤等症。

马兰（马兰头、鸡儿肠、田边菊）

Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip.

【识别特征】菊科。多年生草本。茎多分枝。茎生叶卵状长圆形，叶缘具齿。头状花序，舌状花淡紫色；筒状花黄色。瘦果扁倒卵形长圆形，褐色。花果期5 ~ 10月。

【分布生境】南方各地。生田野。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，凉。清热解毒、凉血止血、利尿消肿。用于吐血，黄疸，水肿，咽痛等症。



金腰箭（苦草、苞壳菊）

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

【识别特征】菊科。一年生草本。叶卵状披针形或椭圆状卵形，主脉3条。头状花序小，腋生或顶生。舌状花黄色，中央管状花两性，先端4齿裂。雌花的瘦果扁平，具2翅，翅撕裂状。瘦果扁平或三角形，有小疣，顶角有芒刺。花果期4～9月。

【分布生境】南方各地。生田野。

【药用功效】全草入药，全年采集。性味辛，苦，凉。清热透疹、解毒消肿。用于感冒发热，咽痛，疮痈肿毒等症。

金纽扣（天文草、散血草）

Spilanthes paniculata Wall. ex DC.

【识别特征】菊科。一年生草本。茎紫红色。单叶对生，广卵形。头状花序顶生，深黄色；舌状花舌片小。瘦果倒卵形，两面扁平，边缘具睫毛。花果期4 ~ 11月。

【分布生境】华南、西南等地。生田野、沟旁、草丛湿地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，苦，微温。解毒、消炎、止咳平喘、止痛。用于感冒咳嗽，哮喘，百日咳，肠炎，痢疾，风湿性关节炎，跌打损伤，毒蛇咬伤等症。

蒲公英（婆婆丁、黄花地丁、孛孛丁菜）

Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.

【识别特征】菊科。多年生草本。叶基生莲座状，长圆状倒披针形、倒向大头羽裂或羽裂。舌状花黄色。瘦果椭圆形或倒卵形，棱上有刺状突起，顶端具细长的喙；冠毛白色。花果期3～7月。

【分布生境】全国各地。生农田、路边、村寨旁、荒地。

【药用功效】全草入药，刚开花时采集。性味苦，寒。清热解毒、消肿散结。用于上呼吸道感染，感冒发热，肝炎，胆囊炎，目赤肿痛等症。



苍耳（苍耳子、刺儿棵）

Xanthium sibiricum Patrin

【识别特征】菊科。一年生草本。茎粗糙，具短毛。叶互生，三角状卵形或心形。边缘有缺刻。头状花序顶生或腋生，雄花序在上，雌花序在下。总苞坚硬，具疏生的钩状刺。瘦果2，灰黑色。花果期7 ~ 11月。

【分布生境】全国各地区。生田野。

【药用功效】果实入药，秋季采集。性味辛，苦，有毒。散风祛湿、通鼻窍。用于风寒头痛，流涕，湿痹拘挛，风疹瘙痒等症。

甘野菊（野黄菊、山菊花）

Dendranthema lavandulifolium var. *seticuspe* (Maxin.) Shih

【识别特征】菊科。多年生草本。多分枝，被疏柔毛。叶片三角形，羽状深裂或全裂，侧生裂片2 ~ 3对，先端具小尖，无毛或几无毛。头状花序，多数在茎顶成伞房状，花黄色。瘦果。花果期9 ~ 11月。

【分布生境】全国大部分地区。生荒野。

【药用功效】花入药，秋季采集。性味辛，苦，寒。清热解毒、平肝降压。用于目赤肿痛，疔疮痈肿，头痛眩晕，高血压病等症。

红花（金红花、草红花、刺红花）

Carthamus tinctorius L.

【识别特征】菊科。一年生草本。茎直立，上部多分枝。叶片长椭圆形，先端尖，基部抱茎，叶缘有齿，齿端有尖刺。头状花序顶生，排成伞房状；总苞片数层，卵状披针形，边缘具刺。管状花，初时为黄色，渐变橙黄色。蒴果椭圆形。花果期6～9月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】花入药，夏季采集，阴干或烘干。性味温，辛。活血通经、散瘀止痛。用于瘀血经闭，痛经，恶露不行，跌打损伤，疮疡肿痛等症。孕妇慎用。

土木香（祁木香、青木香、黄花菜）

Inula helenium L.

【识别特征】菊科。多年生草本。株体密被短柔毛。根肥大粗壮，土黄色。基生叶大，阔披针形，边缘具锯齿，叶柄较长。茎生叶较大，无叶柄，基部半抱茎。头状花序腋生，总苞片覆瓦状排列，外层苞片卵形叶状。花鲜黄色，舌状花雌性，条形；管状花两性。瘦果有棱和细沟，冠毛污白色。花果期6～9月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】根入药，秋末采集。性味辛，苦，温。健脾和胃、行气止痛。用于胸腹胀满疼痛，呕吐泄泻，痢疾，疟疾等症。

野慈姑（慈菇、燕尾草、水茨菰）

Sagittaria trifolia L.

【识别特征】泽泻科。多年生水生草本。地下根茎先端膨大成球茎。叶片箭形，有长柄。花白色3 ~ 5朵轮生，集成总状花序。瘦果斜倒卵形，扁平，黄褐色，边缘有宽翅。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生稻田、沼泽地、池塘或浅水中。广为栽培。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味辛，寒，有小毒。清热解毒、消痈散结。用于恶疮丹毒，润肺止咳，黄疸等症。

禾本科

芦苇（苇子、芦根）

Phragmites australis (Cav.) Trin.

【识别特征】禾本科。多年生草本。地下匍匐根状茎中空，节处生根及芽。叶鞘圆筒形。叶条状披针形。圆锥花序顶生，疏散，小穗含4～7朵花。颖果长圆形。花果期6～11月。

【分布生境】全国各地。生水中及湿润地。

【药用功效】根茎入药，全年采集。性味甘，寒。清热生津、利尿。用于热病烦渴，肺热咳嗽，肺热吐脓，热淋涩痛等症。

白茅（茅根、甜根、丝茅根）

Imperata cylindrica (L.)Beauv.*var.major* (Nees) C.E. Hubb.

【识别特征】禾本科。多年生草本。具地下根状茎，节明显稍突起。叶条状披针形。圆锥花序圆柱形，分枝短紧密。小穗披针形，边缘具纤毛，背面疏生丝状柔毛。颖果暗褐色。果序成熟时被白色长柔毛。花果期4 ~ 7月。

【分布生境】全国大部分地区。生荒地。

【药用功效】根茎入药，春、秋季采集。性味甘，寒。清热利尿、凉血止血。用于热病烦渴，急性肾炎，水肿，吐血，尿血，小便不利等症。

薏苡（薏苡仁、川谷）

Coix lacryma-jobi L.*var.ma-yuen* (Roman.) Stapf

【识别特征】禾本科。一年生草本。秆直立，多分枝。叶鞘光滑，叶舌质硬。叶条状披针形。总状花序，腋生成束，稍下垂。花单性，雌雄同株，雄小穗覆瓦状排列于穗轴上，雌小穗位于雄小穗下方，包于卵形硬质总苞内，成熟后渐变珠状。总苞具珐琅质。颖果包于总苞内，乳白色，一端具较宽的凹槽。花果期7 ~ 10月。

【分布生境】全国各地有栽培。长江以南有野生。

【药用功效】颖果入药，秋季采集。性味甘，淡，凉。清热排脓、健脾、止泻。用于水肿，小便不利，脚气，肺痈，肠痈，脾虚泄泻等症。

莎草科

香附子（香附、莎草根、三棱草）

Cyperus rotundus L.

【识别特征】莎草科。多年生草本。块茎纺锤形，具须根，表面黑褐色。秆三棱形。基生叶，狭线条形，叶鞘闭合包于秆上。花序复穗状，3 ~ 6个在秆顶排成伞状。叶状总苞2 ~ 4片。小穗宽线形，鳞片2列，卵形，膜质，两侧紫红色，鳞片具脊及不明显的少数脉。小坚果，长圆倒卵形，三棱状。花果期6 ~ 11月。

【分布生境】全国各地区。生荒地草丛、沟渠边、湿润地。

【药用功效】块茎入药，秋季采集。性味辛，苦，甘，温。理气解郁、健胃、调经止痛。用于胃痛，腹胀，胸脘痞闷、消化不良，月经不调，痛经，乳房胀痛等症。

半夏（三叶半夏、半月莲、三步跳）

Pinellia ternata (Thunb.)Breit.

【识别特征】天南星科。多年生草本。块茎近圆球形。叶片3全裂，叶柄基部有珠芽。花单性同株，佛焰苞绿色。肉穗花序。浆果，卵状椭圆形，绿色。花果期5～9月。

【分布生境】东北、华北、华东、西南等地。生田野、山坡阴湿处。

【药用功效】块茎入药，秋季采集。性味辛，温，有毒。燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结。用于痰多咳喘，呕吐反胃等症。

掌叶半夏（虎掌南星、独角莲、狗爪半夏）

Pinellia pedatisecta Schott

【识别特征】天南星科。多年生草本。块茎近圆球形。叶片掌状裂。佛焰苞绿色。肉穗花序。浆果，卵圆形，绿色或黄白色。花果期6 ~ 11月。

【分布生境】华北、华东、华中、西南等地。生林下、山坡阴湿处。

【药用功效】块茎入药，秋季采集。性味辛，苦，温。燥湿化痰、散结消肿。用于痰多咳喘，风疾眩晕，半身不遂等症。

海芋（广东狼毒、野芋头、毒芋头）

Alocasia macrorrhiza (L.) Schott

【识别特征】天南星科。多年生草本。茎肉质粗壮，皮黑褐色。叶盾形，阔卵形，先端短尖，基部广心状箭形，侧脉9～12对；叶柄粗壮，基部扩大抱茎。花雌雄同株。佛焰苞浅绿色。肉穗花序短于佛焰苞。浆果红色。花果期春至秋季。

【分布生境】华南、西南等地。生山谷、沟边等湿润地。

【药用功效】根茎入药，全年采集。性味淡，寒，有大毒。清热攻毒、行气止痛、散结消肿。用于感冒，肺结核，疔疮肿毒，风湿骨痛，虫蛇咬伤等症。

鸭跖草科

鸭跖草（竹叶菜、竹节菜）

Commelina communis L.

【识别特征】鸭跖草科。一年生草本。茎多分枝，节部稍膨大。单叶互生，卵状披针形。总苞片心状卵形，边缘对合折叠。花腋生或顶生，深蓝色，花瓣3。蒴果椭圆形。花果期5～11月。

【分布生境】全国大部分地区。生农田、湿润地。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味甘，淡，寒。清热解毒、利水消肿。用于风热感冒，咽喉炎，尿路感染等症。

吊竹梅（水竹草、鸭舌红、凤眼草）

Zebrina pendula Schnizl.

【识别特征】鸭跖草科。多年生草本。茎多分枝，具淡紫色斑点。叶片卵状椭圆形，叶面杂生白色或紫色条纹，背面紫红色。花簇生苞片内，花冠管白色，裂片3，浅红紫色，花丝被紫蓝色长毛。蒴果。花果夏至秋季。

【分布生境】全国广为栽培。生山谷、村旁等湿润地。

【药用功效】全草入药，全年可采。性味甘，淡，寒。清热利湿、解毒凉血。用于水肿，小便不利，咽喉肿痛，咳嗽，疮痈肿毒，虫蛇咬伤等症。

百合科

黄精（仙人余粮、野生姜）

Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute

【识别特征】百合科。多年生草本。根茎圆柱形，节部膨大。叶片常4～6片轮生。花序下垂，花白色。浆果球形。花果期5～8月。

【分布生境】安徽以北地区。生山坡草地。

【药用功效】根状茎入药，春、秋季采集。性味甘，平。补中益气、润肺、益肾。用于脾胃虚弱，体倦乏力，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴等症。

玉竹（铃铛菜、山玉竹、葳蕤）

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce

【识别特征】百合科。多年生草本。根茎圆柱形。叶片卵状矩圆形。花序下垂；花被筒状钟形。浆果球形，蓝色。花果期5～9月。

【分布生境】长江以北。生山坡、林缘。

【药用功效】根状茎入药，春、秋季采集。性味干，平。养阴润燥、生津止渴。用于肺胃阴伤，燥热咳嗽，咽干口渴，内热消渴等症。

卷丹（百合、山百合）

Lilium lancifolium Thunb.

【识别特征】百合科。多年生草本。地下鳞茎宽卵状球形。叶腋内有珠芽。花数朵生茎顶部，花下垂，橘红色；花被片反卷，具紫黑色斑点。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡草地、林缘。

【药用功效】鳞茎和花入药，秋季采集。性味甘，寒。养阴润肺、清心安神。用于肺痨久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，神志恍惚，脚气浮肿等症。



山丹（细叶百合、卷莲花）

Lilium pumilum DC.

【识别特征】百合科。多年生草本。地下鳞茎卵状球形。花数朵生茎顶部，花下垂，鲜红色；花被片反卷。花果期6～9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生山坡草地或灌丛。

【药用功效】鳞茎和花入药，秋季采集。性味甘，微苦，平。润肺止咳、清心安神。用于肺痨久咳，痰中带血，虚烦惊悸，失眠多梦，神志恍惚，脚气浮肿等症。

知母（串地龙、连母）

Anemarrhena asphodeloides Bge.

【识别特征】百合科。多年生草本。根茎横走，密生须根。基生叶线条形，叶基部扩大。花莛具散生鳞片状小苞片。花被片6，黄白色。蒴果卵圆形。花果期5 ~ 9月。

【分布生境】东北、华北、西北等地。生向阳丘陵、山坡草地。

【药用功效】根茎入药，春、秋季采集。性味苦，寒。清热泄火、生津润燥。用于肺热燥咳，肠燥便秘，内热消渴等症。

韭菜（扁菜、起阳草、韭菜子）

Allium tuberosum Rottl.

【识别特征】百合科。多年生草本。根茎横走。叶扁平，条形。伞形花序顶生。花被片6，白色或微红。蒴果倒卵形，有三棱。种子黑色，表面有皱纹。花果期7 ~ 9月。

【分布生境】全国广为栽培。

【药用功效】种子入药，秋季采集。性味辛，甘，温。补肝肾、暖腰膝、助阳、固精。用于腰膝酸软，小便频数，阳痿，遗精，遗尿，白带过多等症。

薤白（小根蒜、野蒜）

Allium macrostemon Bge.

【识别特征】百合科。地下鳞茎近球形，外皮灰黑色，膜质。叶片多为半圆柱形，中空。总苞宿存；伞形花序半球形或球形，密生暗紫色珠芽。花淡紫红色。花果期5～7月。

【分布生境】全国大部分地区。生丘陵、山坡、果园、荒地。

【药用功效】鳞茎入药，春、秋季采集。性味辛，苦，温。理胃温中、行气。用于胃气滞，泻痢，霍乱等症。

萱草（黄花菜根、漏芦根果、地人参）

Hemerocallis fulva L.

【识别特征】百合科。多年生草本。根状茎粗，具肉质纺锤形块根。叶条状披针形。圆锥花序顶生。花大，橙色或橙红色，裂片6，2轮，中部有红色条带。蒴果长圆形，成熟时开裂。花果期6 ~ 9月。

【分布生境】南方地区。生山坡阴湿处。

【药用功效】根入药，夏、秋季采集。性味甘，凉。清热利尿、凉血止血。用于水肿，小便不利，膀胱炎，尿血，便血等症。

沿阶草（麦冬、麦门冬、山椒草）

Ophiopogon bodinieri Levl.

【识别特征】百合科。多年生草本。块根纺锤形，表面黄白色。叶丛生，狭长条形。花莛较叶短或等长。总状花序，花常单生或2朵簇生于苞腋内；花被片在花盛开时展开。花柱细。果实浆果状，球形，熟后暗蓝色。种子近球形或椭圆形。花果期6 ~ 10月。

【分布生境】全国广为栽培。生山坡、林下、湿润处。

【药用功效】块根入药，秋季采集。性味甘，苦，寒。养阴生津、润肺止咳、清心。用于肺燥干咳，虚痨咳嗽，心烦失眠，津伤口渴，肠燥便秘等症。同属植物麦冬*Ophiopogon japonicus*(L.f.) Ker-Gawl.同等入药。

石蒜（红花石蒜、螃蟹花、山蒜）

Lycoris radiata (L Herit.) Herh

【识别特征】石蒜科。多年生草本。地下鳞茎宽椭圆形或球形，基部生许多白色须根；外皮黑棕色或紫褐色，内部具多层白色黏性的肉质鳞片，中心有黄白色的芽。秋季出基生叶，叶片线形或带形，中脉明显，被粉。花莛在叶前抽出，实心。总苞片2，披针形，干膜质。伞形花序，有花4～7朵，花鲜红色。花被裂片6，红色，狭倒披针形，向外反卷。雄蕊6，花柱细长。蒴果背裂。花果期9～11月。

【分布生境】华东、中南、西南等地。生山地阴湿处、林缘、小溪旁。也有人工栽培。

【药用功效】鳞茎入药，春、秋季采集。性味辛，苦，温。解毒、消肿、催吐。用于咽喉肿痛，疔疮肿毒，痰涎壅塞，食物中毒，胸腹积水，跌打损伤，风湿性关节炎等症。

红玉帘（韭莲、旱水仙、赛番红花）

Zephyranthes grandiflora Lindl.

【识别特征】石蒜科。多年生草本。地下鳞茎卵状球形，褐色，表皮膜质，基部着生多数细根。基生叶簇生，叶片线条形，扁平。花单生花莛顶端，粉红色，漏斗状。花被片6，倒卵形；雄蕊6，着生在花被筒的喉部；花柱丝状突出，柱头3深裂。子房下位，3室。蒴果近球形。种子近扁平，黑色。花期6～9月。

【分布生境】全国各地有栽培。

【药用功效】全草入药，夏、秋季采集。性味苦，寒。解毒消肿、活血凉血。用于跌伤红肿，疮痈红肿，毒蛇咬伤，吐血，便血，血崩等症。

薯蓣科

薯蓣（山药、山芋、山药蛋）

Dioscorea opposita Thunb.

【识别特征】薯蓣科。多年生缠绕草本。块茎肥厚肉质。叶卵状三角形。叶腋处生有珠芽。雌雄异株。穗状花序生叶腋。雄花序直立簇生，花乳白色；雌花序下垂。蒴果倒卵状圆形，具3翅。花期7～8月。

【分布生境】全国各地。生山坡灌丛。

【药用功效】根茎入药，秋季采集。性味甘、平。健脾胃、固肾益精、补中益气。用于体虚，食欲不振，虚痨咳嗽，腹泻等症。

穿山龙（串地龙、地龙骨）

Dioscorea nipponica Makino

【识别特征】薯蓣科。多年生缠绕草本。序穗状细长，花黄绿色；雌花序下垂。蒴果根茎肥厚。叶掌状3～7裂。雌雄异株。雄花倒卵状圆形，具3翅。花期7～9月。

【分布生境】东北、华北、华东、西北等地。生山坡灌丛。

【药用功效】根茎入药，秋季采集。性味甘，苦，温。舒筋活血、止咳化痰。用于腰腿疼痛，跌打损伤，咳嗽，气管炎等症。

射干（扁竹、蝴蝶花）

Belamcanda chinensis (L.) DC.

【识别特征】鸢尾科。多年生草本。根状茎横生，具结节。叶2列，扁平，叶基抱茎。聚伞花序顶生，二歧分枝。花被片橘黄色，有红色斑点。蒴果三角状倒披针形。种子近圆形，黑色，有光泽。花期7 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区。生山坡、草地、林缘。广为栽培。

【药用功效】根茎入药，初春、秋末采集。性味苦，寒。清热解毒、消肿止痛。用于咽喉肿痛，肺热咳嗽，痰多气喘等症。

鸢尾（蓝蝴蝶、土知母）

Iris tectorum Maxim.

【识别特征】鸢尾科。多年生草本。根状茎粗短。叶2列，扁平，剑形。花被片蓝紫色，外轮花被片中部具鸡冠状突起，白色或浅蓝色。蒴果长椭圆形，有6棱。种子圆形，黑褐色，具假种皮。花期4 ~ 10月。

【分布生境】全国大部分地区有栽培。

【药用功效】根茎入药，初、秋末采集。性味苦，寒。清热解毒、消肿止痛。用于咽喉肿痛，痰咳气喘等症。

马蔺（马莲、马莲子）

Iris lactea Pall.var.*chinensis* (Fisch.) Koidz.

【识别特征】鸢尾科。多年生草本。叶线条形，平滑无毛。花蓝紫色。花被片6，外轮3片较大，向外弯曲下垂，中部有黄色条纹；内轮3片较小，披针形，直立。蒴果长圆柱形，具三棱，顶端细尖。种子近球形，红褐色，具不规则的棱。花期4～7月。

【分布生境】全国大部分地区。生向阳山坡、荒地、公园。

【药用功效】全草入药，秋季采集。性味甘，平。清热、利湿、止血、解毒。用于黄疸，泻痢，吐血，血崩，白带，喉痹，痈肿等症。

兰科

天麻（明天麻、神草、赤箭芝）

Gastrodia elata Bl.

【识别特征】兰科。多年生共生草本。块茎肉质肥厚，长圆形，具不明显的环节，表面淡黄棕色。茎直立，圆柱形，黄褐色。叶鳞片状，膜质，下部鞘状抱茎。总状花序顶生，苞片披针形；花淡黄绿色或橙黄色，花梗短；萼片与花瓣合生成壶形，口部偏斜，顶端5裂；唇瓣白色，先端3裂；子房下位。蒴果长圆形或长圆状倒卵形。种子呈粉末状。花果期6～8月。

【分布生境】东北、华北、华中、西北、西南等地。生林下湿润腐殖质较多的地方。须与白蘑科密环菌*Armillariella mellea* (Vahl ex Fr.) Karst.共生。现许多地方有栽培。

【药用功效】块茎入药，春、冬季采集。性味甘，平。平肝息风、定惊。用于头痛眩晕，肢体麻木，半身不遂，癫痫，小儿惊风等症。

灵芝（赤芝、菌灵芝、灵芝草）

Ganoderma lucidum (Leyss.ex Fr.) Karst.

【识别特征】多孔菌科。为真菌植物。子实体木栓化，菌盖半圆形或肾形，红褐色、红紫色或暗紫色，略有光泽，表面有环形棱纹；菌盖背面有无数个小孔，菌管口初为白色，后渐变褐色，孢子产生于担子顶端，孢子极小，卵圆形，褐色，孢子壁两层，内壁褐色，表面有小疣，外壁透明无色。菌柄侧生，近圆柱形，紫褐色。

【分布生境】全国大部分地区。生阔叶林腐朽的木桩上。现广为栽培。

【药用功效】子实体及孢子粉入药，夏、秋季采集。性味甘，平。补气安神、止咳平喘。用于虚痨，咳嗽，气喘，神经衰弱，失眠，消化不良等症。同科紫芝*Ganoderma japonicum* (Fr.) Lloyd 同等入药。

海带科

昆布（海带、纶布）

Laminaria japonica Aresch.

【识别特征】海带科。多年生大型褐藻，成熟时呈橄榄绿褐色。根状固着器粗纤维状，由条叉状分歧的假根组成，假根末端有吸着盘吸附在岩石上。叶柄圆柱形，长约5～15cm，叶柄的上部为叶状体，带状，扁平，光滑，有黏液，长可达数米；叶中部稍厚，两边较薄，呈波状。生殖期在叶片两面产生孢子囊。

【分布生境】辽东半岛、山东半岛及浙江、福建、广东等沿海地区。生海潮线下1～3米的岩石上。现广为人工养殖。

【药用功效】干燥叶状体入药，夏、秋季捕捞。性味咸，寒。软坚散结、利水。用于瘿瘤，瘰疬，水肿，睾丸肿痛，带下等症。

第二章　动物药材

一、陆地动物药材

斑翅蝗科

东亚飞蝗（蝗虫、蚂蚱、蚱蜢）

Locusta migratoria manilensis (Mey.)

【识别特征】斑翅蝗科。体绿色至黑褐色。雌成虫体长3.9 ~ 5.1cm；雄成虫体长3.3 ~ 4.1cm。头顶短宽，颜面近垂直；触角丝状。散居型前胸背板中隆线隆起呈弧形，群居型则较平直或微凹。中胸腹板侧叶间中隔的长度大于其宽度。前、后翅长度常超过后足胫节的中部。

【分布生境】全国大部分地区。为不完全变态昆虫。北方一年发生2代。群居型可迁飞。生荒滩、田野、山坡，喜食禾本科植物。

【药用功效】干燥成虫入药，夏、秋季捕捉。性味咸，平。止咳平喘、定惊止痉、解毒、透疹、消肿、滋补强壮、暖胃、助阳。用于营养不良，小儿惊风，小儿疳积，哮喘，肺结核，出疹不畅等症。

斑腿蝗科

中华稻蝗（稻蝗、蚱蜢）

Oxya chinensis (Thunb.)

【识别特征】斑腿蝗科。体绿色至黄褐色。雌成虫体长2.8 ~ 4.1cm，雄成虫体长2.2 ~ 2.3cm，在复眼之后及前胸背板侧面有深褐色和黄色带。

【分布生境】全国大部分地区。为不完全变态昆虫。北方一年发生1代。生稻田、沟渠边，喜食禾本科植物等。

【药用功效】干燥成虫入药，秋季捕捉。性味辛，甘，温。暖胃助阳、健脾运食、止咳。用于小儿惊风，百日咳、斑诊不出等症。

蟋蟀（蛐蛐、斗蟋、将军干）

Scapsipedus micado Saussure

【识别特征】蟋蟀科。体黑褐色。头顶短圆，有光泽；前胸背板横方形。雄虫前翅比雌虫长，具发音器；雌、雄虫后翅均不发达。雌虫尾端有一个箭形产卵器。

【分布生境】全国大部分地区。为不完全渐变态昆虫。一年发生1代。喜在砖块、墙缝等处中穴居生活，昼伏夜出。

【药用功效】干燥成虫入药，秋季捕捉。性味咸，辛，微温。利尿、消水肿。用于阳痿，利尿，消肿，慢性肾炎等症。

蝼蛄（东方蝼蛄、啦啦蛄、大土狗）

Gryllotalpa 0rientalis Burmeister

【识别特征】蝼蛄科。虫体土黄色。雄虫体长约4cm，前胸背板盾形。前足为开掘足。后足胫节背侧内缘有3～4个能动的刺。

【分布生境】全国大部分地区。不完全变态昆虫。北方每3年完成1代，以成虫和若虫在土中越冬。夜间活动，有趋光性。

【药用功效】干燥成虫入药，夏、秋季捕捉。性味咸，寒。利水消肿、通淋。用于小便不利，水肿，恶疮等症。



家蚕（桑蚕、丝蚕、白僵蚕）

Bombyx mori Linnaeus.

【识别特征】蚕蛾科。成虫体白色，密被细鳞片，体长1.3 ~ 2.5cm；触角羽状，黄褐色；前翅近三角形，有3条淡暗色横纹；后翅有2条深色平行线。老熟幼虫灰白色，体长4 ~ 5cm。头小，体为13节，两侧有椭圆形气门，第8腹节背上有一个尾尖。蛹包于茧内，棕黄色，长椭圆形；前胸背板三菱形，中部有一条纵脊。

【分布生境】许多地区有饲养。为完全变态昆虫。以桑叶为食。

【药用功效】主要以僵蚕入药，随时采集。白僵蚕性味辛，咸，平。祛风解痉，化痰散结。用于中风失音、惊癫、喉风、乳腺炎等症。蚕蛹性味甘，平。消疳热，强身。用于小儿疳热、消渴等症。雄蚕蛾性味咸，温。补肝益肾、壮阳涩精。用于阳痿，尿血，溃疡等症。蚕蜕性味甘，平。用于崩漏，喉风，目翳等症。

蚱蝉（知了、黑蚱蝉、蜩、蝉蜕）

Cryptotympana atrata (Fabricius)

【识别特征】蝉科。成虫体黑色，长约4.5cm。触角鬃状，刺吸式口器。中胸背板中部有近似“∪”形的纹。雄虫鸣叫，在腹部第一节有2个半圆形背瓣完全盖住发音器。雌虫不能鸣叫，腹部末端产卵器甚明显。老熟若虫土黄色。前足为开掘式；胸部两侧各有1对翅芽，胸部中间有一条蜕裂线，成虫由此线钻出羽化。

【分布生境】全国大部分地区。若虫在土中生活3年出土羽化。成虫在树木上以刺吸树液为生。

【药用功效】若虫羽化时脱落的皮壳（即蝉蜕）入药，夏季捕捉。性味咸，凉，无毒。散风清热、明目、宣肺、定痉。用于外感风热，咳嗽音哑，麻疹不透，风疹瘙痒，小儿惊风，伤风等症。

冬虫夏草（虫草、冬虫草、雅扎贡布）

Hepilus armoricanus Oberthür.

【识别特征】蝙蝠蛾科。为蝙蝠蛾*Hepilus armoricanus* Oberthür.的幼虫被真菌门麦角科真菌——冬虫夏草菌*Cordyeps sinensis* (Berk.) Saoc.寄生后所产生的子座及幼虫尸体的复合物。子囊菌的子座单生于寄主幼虫的头部，细长如棒棍状，子座上部稍膨大，呈圆柱形，黑褐色。被真菌寄生的幼虫体深黄色，形状似老蚕，表面粗糙，背部有多数横皱纹，虫体腹面中部的4对足明显易见，幼虫体的横断面内心充实，白色略发黄，周边为深黄色。

【分布生境】西藏、甘肃、云南、四川、贵州、青海等地。生海拔3000m以上的山坡草甸土中。

【药用功效】干燥虫体入药，夏至前后采集。性味甘，温。补肾益肺、止血化痰。用于慢性支气管炎，肺气肿，肺结核，哮喘、虚劳咳喘，体虚多汗，病后体虚，肾气不足，腰膝酸痛，慢性肾炎，肾功能衰竭，阳痿遗精等症。

蜜蜂（中蜂、东方蜜蜂）

Apis cerana Fabricius

【识别特征】蜜蜂科。工蜂体长1.1 ~ 1.3cm，被黄褐色绒毛。头部前端窄小，触角膝状；复眼1对；单眼周围及颅顶被灰黄色毛。上唇长方形；唇基钝三角形，黄色，中央稍隆起。前翅3亚缘室，缘室几达翅的顶角，第二亚缘室上部比下部窄很多。后翅中脉分叉。后足胫节扁平，无距；基跗节宽扁；后足胫节端部与基跗节基部外侧着生长毛，形成携带花粉的花粉篮。足及腹部3 ~ 4节背板红黄色；5 ~ 6节背板色较深，各节上均有黑色环带。雄蜂体长1.2 ~ 1.5cm，体黑色，全身被黑褐色杂有白色的毛；复眼大，在头顶上几乎相连。蜂王体长1.4 ~ 1.9cm，体形肥大，有两种体色；一种是腹部黄色环明显，腹部呈暗褐色；另一种是腹部黑色环明显，腹部呈黑色。

【分布生境】全国各地区。为完全变态昆虫，营社会性生活。白天采蜜。

【药用功效】蜂毒、蜂蜜、蜂王浆、蜂蜡、幼虫入药，春至秋季采集。

蜜蜂幼虫性味甘，平。祛风、解毒、杀虫。用于风疹，头风，麻风，丹毒，虫积腹痛，妇女带下等症。

蜂毒用于支气管哮喘，风湿，脓肿等症。民间百姓和有些蜂毒研究医院常用活蜜蜂的蜂毒治疗风湿性关节炎。

蜂胶是蜜蜂分泌的黄褐色或黑褐色的黏性物质，蜂胶不溶于水，而溶于乙醇。性味微苦，辛。具有提高人体免疫力，排除体内毒素，清除自由基，软化血管，改善血液循环，促进伤口愈合，预防多种疾病等作用。

蜂蜜性味甘，平。补中、润燥、止痛、解毒。用于治疗体虚、便秘等疾病。

蜂王浆又称蜂乳，是工蜂咽腺分泌的乳白色物质，是饲

喂蜂王的食物。性味甘，酸，平。滋补、强壮、益肝、健脾。用于治疗营养不良，老年体弱，高血压、传染性肝炎，十二指肠溃疡，风湿性关节炎等症。

蜂花粉是蜜蜂在野外花朵上采集的花粉粒经蜜蜂加工而成的花粉团。是蜜蜂食物的主要来源，也是蜜蜂分泌蜂王浆不可缺少的原材料。性味甘，平。具有抗衰老，护肝脏，调节肠胃等保健作用。



蚁科

鼎突多刺蚁（蚂蚁、拟黑多刺蚁、黑刺蚁）

Polyrhachis vicina Roger

【识别特征】蚁科。工蚁体黑色，长0.5cm，密布细小的古铜色匍匐毛和稀疏的长毛。头部短而阔，两颊凸出；复眼圆形；触角膝状，12节；前胸刺向前外方下弯，并胸腹节刺无钩。柄腹的结节高，左右侧角各具1根刺，随腹部体形而弯曲，两刺间中央具钝齿突3个，一前二后成鼎状排列。雌蚁体粗壮，长0.8cm。触角膝状，13节；前胸背板、并胸腹节及柄腹结节各有1对刺状突起，但不如工蚁明显突出。雄蚁体较纤细，长0.6 ~ 0.7cm。触角膝状，14节；前胸背板无刺状物，并胸腹节背面刺状物不明显，柄腹结节背面1对刺状物较明显；具2对翅，翅不脱落。腹部末端较尖。

【分布生境】浙江、广东、广西、福建、贵州等地。生山丘地带。为完全变态昆虫，营社会性生活。

【药用功效】成虫入药，随时捕捉。性味甘，平，微毒。补肾壮阳、祛风湿。用于类风湿性关节炎，肝炎，阳痿，糖尿病等症。

蝽科

九香虫（黑兜蝽、瓜黑蝽、打屁虫）

Aspongopus chinensis Dallas

【识别特征】蝽科。成虫体长1.7 ~ 2.2cm，长椭圆形，黑褐色，稍带铜色光泽，密布刻点。触角第5节黄褐色。前胸背板及小盾片上有近于平行的不规则横皱纹。侧接缘及腹部腹面侧缘区各节黄黑相间，黄色部分狭于黑色部分。后足基部外侧有2个腺孔。

【分布生境】河南、江苏、浙江、湖南、湖北、江西、广东、广西、福建、台湾、贵州、四川、云南等地。我国特有品种。为不完全变态昆虫。江西一年发生1代，以成虫越冬。若虫和成虫喜在瓜秧等植物上刺吸汁液为生。

【药用功效】干燥成虫入药，夏、秋季捕捉。性味咸，温。理气止痛，温中壮阳。用于胸膈气滞，脘痛痞闷，神经性胃痛，脾肾亏损，腰膝酸痛，阳痿等症。

土鳖（地鳖、盖子虫、土元）

Eupolyphaga sinensis Walker

【识别特征】鳖蠊科。雌雄异形。雄虫有翅，雌虫无翅。雌虫体长约3cm，长椭圆状扁形，黑褐色。头小，向腹面弯曲，咀嚼式口器；触角丝状。前胸背板盾状，前狭后阔，盖住头部。腹背板9节，呈覆瓦状排列。胸部具3对足，有细毛和刺。

【分布生境】全国大部分地区。生树根落叶下、石块下、墙角松土中，昼伏夜出。广为人工饲养。

【药用功效】雌虫干燥体入药，夏、秋季捕捉。性味咸，寒，有小毒。破瘀血、通络、续筋骨。用于跌打损伤，筋骨折断，瘀血经闭，产后瘀血腹痛等症。

东亚钳蝎（马氏钳蝎、蝎子、伏背虫）

Buthus martensii Karsch

【识别特征】钳蝎科。东亚钳蝎不属于昆虫，属于节肢动物门、蛛形纲、蝎目的动物。成蝎土黄色，体长4.0～6.0cm。体分头胸部和腹部2部分。头胸部较短，前端两侧角各有3个单眼排成一列，胸背中部有1对中眼；头部有1对似蟹螯状的钳铗。胸部有4对足。腹部分前后2部分。前腹部宽大，分7节；后腹部细长，分5节，末端有尾刺呈上翘钩状，内有毒腺。

【分布生境】我国北方各省及江苏、福建、台湾等地。蝎子为卵胎生动物，多穴居。喜栖息在石缝、石块、砖瓦块下，昼伏夜出，捕食小昆虫。母蝎有把小蝎子背负在背上的习性。广为人工饲养。

【药用功效】干燥成蝎入药，春至秋季捕捉。性味咸，辛，平，有毒。息风镇痉、攻毒散结、通络止痛。用于惊痫抽搐，中风，半身不遂，口眼歪斜，破伤风，淋巴结核，疮疡肿毒等症。

蜈蚣（少棘巨蜈蚣、天龙、百脚）

Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch

【识别特征】蜈蚣科。为节肢动物。体扁平长条形，由22个环节构成。头部2节及触角暗红色，触角17节，单眼4对；头部腹面具颚肢1对，上有毒钩，先端黑色，基部暗红色。体背墨绿色，末板黄褐色。腹板及步肢均为淡黄色。步肢21对生于体两侧，步肢先端常呈黑褐色。

【分布生境】全国大部分地区。栖息于石缝下及潮湿阴暗处。广为人工饲养。

【药用功效】干燥全虫入药，春、夏季捕捉。性味辛，温，有毒。祛风、定惊、攻毒、散结。用于中风，半身不遂，小儿惊风，抽搐痉挛，破伤风，风湿顽痹，疮疡肿毒，百日咳，瘰疬，结核等症。

鹿茸（梅花鹿角、茸角）

Cervus nippon Temminck

【识别特征】梅花鹿，鹿科。体中型。雄鹿有角，雌鹿无角。眼眶下线明显，呈裂缝状。耳大直立。四肢细长。尾短。体被棕黄色毛，具白色斑点；腹部及四肢内侧毛浅黄白色。

【分布生境】东北、华北等地。现多为人工饲养。野生梅花鹿为一级国家重点保护动物，现已禁止非法捕猎和贸易。

【药用功效】雄鹿未骨化的鹿角入药，夏、秋季采集。性味甘，咸，温。壮肾阳、补气血、益精髓、强筋骨。用于虚劳羸瘦，精神倦乏，腰膝酸痛，目暗，耳聋，筋骨痿软，子宫虚冷，畏寒，阳痿滑精等症。鹿皮、鹿肉、鹿血、鹿肾、鹿尾均可入药。

熊（黑熊、黑瞎子）

Selenarctos thibetanus G.Cuvier

【识别特征】熊科。体形较大，全身被黑毛。头宽，吻略短，鼻端裸出；耳略圆，被长毛；眼睛小；脸部栗棕色。胸部有一“V”字形黄白色斑。四肢粗壮。5趾均有爪，前足腕部肉垫和掌部肉垫相接。后足跖部肉垫肥厚，其内侧无距毛。尾短。

【分布生境】全国大部分地区。以东北及华北较多。栖息于森林，多独居，能直立行走，善爬树和游泳，有冬眠的习性。为二级国家重点保护动物，现已禁止非法捕猎和贸易。

【药用功效】胆囊入药，随时可采集。现已采用人工引流技术收集胆汁。性味苦，寒。清热，镇痉，明目。用于肝热炽盛，咽喉肿痛，目赤肿痛，目翳，疮痈，痔疮肿痛，惊风，癫痫等症。熊肉、熊骨、熊脂、熊脑、熊掌、熊筋均可入药。同科动物棕熊 *Ursus arctos Linnaeus* L. 的胆囊同等入药。现在有不少替代药品，人们要尽力保护有限的熊资源。

雉科

乌骨鸡（乌鸡、黑骨鸡）

Gallus gallus domesticus Brisson

【识别特征】雉科。鸡体白色，除两翅羽毛外其他部分毛均呈绢丝状。鸡冠、眼睛、面颊、下坠黑色。耳叶呈紫蓝色。腿及爪黑色。皮、肉、骨均黑色。两翅较短，飞翔能力弱。

【分布生境】原产我国江西泰和地带，现全国大部分地区均有饲养。

【药用功效】全鸡入药，性味甘，平。益气养血，补肝益肾，养阴退热。用于妇女阴血不足、崩漏带下，虚劳骨蒸、脾虚滑泻等症。北京同仁堂生产的乌鸡白凤丸是治疗妇科病的良药。此外，还具有防癌、滋补强壮、抗辐射等作用。

鸡内金（鸡肫皮、鸡黄皮）

【识别特征】为鸡胃的内膜。表面黄色、黄绿色或黄褐色，具明显不规则的条状皱纹，可磨碎小石粒等物。干品略透明，质地脆，断面角质样，有光泽，气味微腥。

【分布生境】全国各地广为饲养。

【药用功效】胃内膜（称鸡内金）入药，杀鸡时采集。性味甘，平。健胃消食、涩精止遗。用于消化不良，积食，小儿疳积，嗳气，反胃呕吐，遗尿，遗精等症。

鸽子（家鸽、信鸽）

Columba livia domestica Gmelin

【识别特征】鸠鸽科。体色以青灰色较多，亦有白色、茶褐色、瓦灰色、黑白色、黑紫色、褐白色、杂色等颜色。头较小而圆，嘴狭尖，先端略膨大弯曲，鼻泡膨大。脖颈短。翅膀发达，善飞翔。脚短健，常呈红褐色、铜黄色不等；爪黑色或白色。

【分布生境】全国大部分地区广为饲养。

【药用功效】全鸽入药，随时捕捉。性味咸，平。滋肾益气、祛风解毒。用于体虚羸瘦，消渴，妇女血虚经闭，恶疮疥癣等症。

麻雀（家雀、瓦雀、老家贼）

Passer montanus saturatus Stejneger

【识别特征】文鸟科。体小型。嘴粗短，圆锥形，黑色；额、后颈栗褐色；眼周围、颏和喉的中部为黑色。颊、耳羽和颈侧为白色，耳羽后部具黑色斑块。上体砂褐色，两肩密被黑色粗纹。小覆羽栗色，中覆羽和大覆羽黑褐色而具白边。尾暗褐色，羽缘色较淡。脚、趾均为黄褐色或淡红褐色。

【分布生境】全国各地。喜栖息在屋檐瓦下。以昆虫、草籽、小麦、谷子、水稻等为食，半害半益。

【药用功效】肉体入药，随时捕捉。性味甘，温。壮阳益精、暖腰膝、缩小便。用于阳虚羸瘦，小便数频，疝气，阳痿，带下，崩漏等症。

壁虎科

蛤蚧（仙蟾、大壁虎、蛤蚧干）

Gekko gecko Linnaeus

【识别特征】壁虎科。为爬行动物。体似壁虎，长约20cm，全身生密磷。头较大，呈三角形；口内有细齿；眼大突出；吻端凸圆；鼻孔近吻端。体背紫灰色，具砖红色及蓝灰色斑点。腹部近白色，散生砖红色斑点。尾细长，断后能再生。四足均具5趾，趾间具蹼迹，足趾底有吸盘。药材为扁片状，固定在竹片上。

【分布生境】广东、广西、云南、贵州等地。栖息山岩、树洞中，昼伏夜出。

【药用功效】除去内脏的干燥体入药，全年可捕捉。常以一对药用。性味咸，平。补肺益肾、定喘止咳、助阳益精。用于虚劳，肺痿，喘咳，咯血，阳痿，遗精等症。



二、水生动物药材

龟科

龟（乌龟、水龟）

Chinemys reevesii (Gray)

【识别特征】龟科。体扁圆形，腹背均具坚硬的甲。头略呈方形，后端具小鳞，鼓膜明显；吻端尖圆，颈能伸缩。甲由真皮形成的骨板组成，骨板外被鳞甲。背甲棕褐色，中央具5块脊鳞甲，两侧各有4块肋鳞甲，边缘每侧有11块鳞甲，肛鳞甲2块。腹面鳞甲12块，呈板片状，淡黄色。背腹鳞甲在体侧相连。尾短而尖细。四肢较扁平，指、趾间有蹼，后肢第5趾无爪，其余均有爪。

【分布生境】全国大部分地区。常栖息在川泽、湖泊、池塘中。广为人工养殖。

【药用功效】干燥背甲、腹甲（龟板、龟甲）入药，全年可捕捉。性味甘，咸，微寒。滋阴、潜阳、补肾、健骨。用于肾阴不足，骨蒸劳热，盗汗，头晕目眩，心虚健忘，久咳，遗精，带下，腰痛，筋骨痿软，小儿囟门不合等症。龟肉、龟血、龟脂、龟甲胶、龟胆均可入药。

鳖科

鳖（中华鳖、团鱼）

Trionyx sinensis Wiegmann

【识别特征】鳖科。体椭圆形，背面隆起，边缘凹入，黑褐色或墨绿色，表面有小疣。甲壳边缘柔软，俗称裙边。腹面黄白色，有淡绿色斑。头小，颈粗长，吻突出，吻端有1对鼻孔；眼小。头颈可完全缩入甲壳内。前肢和后肢均5指，仅内侧3指有爪。指、趾间具蹼。雄性体较扁，尾较长，末端露出甲边；雌性不露出。

【分布生境】全国大部分地区。生湖泊、江河、池塘中。广为人工养殖。

【药用功效】干燥背甲（鳖甲、甲鱼壳）入药，全年可捕捉。性味咸，微寒。养阴清热、平肝息风、软坚散结。用于阴虚发热，劳热骨蒸，经闭，小儿惊痫等症。鳖肉、鳖头、鳖血、鳖脂、鳖甲胶、鳖胆、鳖卵均可入药。

中华蟾蜍（癞蛤蟆、蟾酥）

Bufo bufo gargarizans Cantor

【识别特征】蟾蜍科。体粗壮，长10cm以上，雄性较小。体皮肤粗糙，布满大小不等的瘰粒，腹部有小疣。头宽大，口阔无齿，头顶部两侧各有一个隆起的长椭圆形腺体。前肢指趾略扁，无蹼；后肢粗壮，趾侧有缘膜，蹼尚发达。雄性前肢内侧3指有黑色婚垫。头部无声囊。

【分布生境】全国大部分地区。生江河、湖泊、沼泽地等。

【药用功效】蟾酥入药（耳后腺体的白色分泌物），全年可采集。性味辛，凉，有毒。解毒止痛、开窍醒神。用于咽喉肿痛，水肿，腹痛，痈疽疔疮，神昏，中暑，吐泻，慢性气管炎等症。头、皮、肝、胆均可入药。

螺蛳（蜗篱、蛳螺）

Bellamya quadrata (Benson)

【识别特征】田螺科。螺壳圆锥形，坚硬，螺纹较粗，黄褐色或深褐色。壳口卵圆形，边缘完整。厣角质，黄褐色，卵圆形，上有同心环状排列的生长纹。头部圆柱形，前端有突出的口吻；口基部有1对触角，每个触角基部的外侧有1个隆起的眼。足位于头部下方，跖面宽阔。头和足能缩入壳内，缩入后厣将螺口封闭。

【分布生境】全国大部分地区。生江河、湖泊、池塘、水田中。

【药用功效】螺壳（白螺蛳壳）及螺肉入药，随时捕捞。螺肉性味甘，寒。清热、利水、明目。用于消渴，淋浊，黄疸，痢疾，痔疮，目赤翳障，肿毒等症。螺壳性味甘，淡，平。化痰、止痛，敛疮、散结。用于热痰咳嗽，胃痛，反胃，吐酸，溃疡等症。

背角无齿蚌（河蚌、河蛤蜊、淡水珍珠）

Anodonta woodiana Lea

【识别特征】蚌科。贝壳2片，呈具角状突的卵圆形。贝壳顶部位于背缘中央稍扁前方。壳前背缘短于后背缘。壳面绿褐色，有细环形肋脉。铰合口无齿，韧带坚固。壳内乳白色，其上生多枚珍珠。珍珠球形、长圆形不等，半透明，光滑或具纹线，有白色、浅粉色等。

【分布生境】全国大部分地区。生江河、湖泊中。有人工养殖。

【药用功效】珍珠、贝壳粉及蚌肉均可入药，夏、秋季采集。珍珠性味甘，咸，寒。安神定惊、解毒生肌、明目消翳。用于惊悸失眠，惊风癫痫，目生云翳，疮疡不敛等症。贝壳粉性味咸，寒。清热燥湿、化痰消积。用于咳嗽，胃痛，呕逆，痈肿，湿疮，白带等症。蚌肉性味甘，咸，寒。清热明目、滋阴、解毒。用于烦热，消渴，目赤，湿疹，血崩，带下等症。同科动物褶纹冠蚌*Cristaria plicata* Lea；三角帆蚌*Hyriopsis cumingii* Lea同等入药。

鲍科

石决明（盘大鲍、鲍鱼皮、毛底海决）

Haliotis gigantea discus Reeve

【识别特征】鲍科。贝壳单片，耳状，长5 ~ 12cm，宽3 ~ 8cm。壳面灰棕色或灰黄色，粗糙，凸凹不平，肋状纹理不显著，常有石灰虫和苔藓虫附生其上。螺肋末端4 ~ 5孔开口突出壳面，内外相通。壳内面呈珍珠光泽。壳口卵圆形，外唇薄，边缘呈刃状，内唇加厚，由壳口内面延伸形成一上端较宽、基部较狭的片状遮缘。

【分布生境】我国北方沿海一带。以藻类植物为食。

【药用功效】贝壳入药，夏、秋季捕捞。性味咸，平。平肝潜阳、除热、明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，骨蒸劳热等症。其他种类鲍鱼的贝壳同等入药。

牡蛎（近江牡蛎、蚵蛤、海蛎子壳）

Ostrea rivularis Gould

【识别特征】牡蛎科。贝壳2片，坚硬厚实，呈圆形、卵圆形或三角形。左壳附着，较大而厚。右壳（即上壳）略扁平，较左壳略小，鳞片层层相叠。壳面有灰、青、紫、棕、黄等色彩。壳内面白色，边缘有时淡紫色。壳内肉淡黄色。

【分布生境】我国沿海地区。生江河流入海处。有人工养殖。

【药用功效】贝壳及肉入药，全年捕捞。贝壳性味咸，涩，凉。安神、潜阳补阴、软坚散结、收敛固涩。用于惊悸失眠，眩晕耳鸣，瘰疬，胃痛泛酸，盗汗自汗等症。贝肉性味甘，咸，平。滋阴养血。用于烦热失眠，心神不安，丹毒等症。同属动物长牡蛎*Ostrea gigas* Thunberg；大连湾牡蛎*Ostrea talienwhanensis* Crosse的贝壳和肉同等入药。

瓦楞子（毛蚶、毛蛤蜊）

Arca subcrenata Lischke

【识别特征】蚶科。贝壳较短而宽，坚硬，呈长卵形。两壳通常不等大，右壳比左壳略小。背侧两端略具棱角。壳表放射肋30 ~ 34条，肋上有小结节，左壳上的小结节较明显。壳面灰白色，被棕黑色的细毛。铰合部直，铰合齿约50枚。

【分布生境】我国沿海地区。生活浅海水底泥沙中。

【药用功效】贝壳（蚶子壳）入药，全年均可捕捞。性咸，温。补血、温中、健胃。用于胃痛泛酸，消化不良，血虚痿痹等症。同属动物魁蚶*Arca inflata* Reeve.及泥蚶*Arca granosa* Linnaeus的贝壳同等入药。

帘蛤科

文蛤（花蛤、黄蛤）

Meretrix meretrix Linnaeus

【识别特征】帘蛤科。贝壳2片，坚硬，表面膨胀光滑。背缘略呈三角形，腹缘略呈圆形。壳面黄褐色，同心纹明显，常有齿状或波纹状褐色花纹。壳内面白色。铰合部较宽，右壳主齿3个前侧齿2个；左壳主齿3个前侧齿1个。

【分布生境】我国沿海地区。

【药用功效】贝壳（白蜊壳）入药，全年捕捞。性味咸，平。清热、利湿、化痰、软坚。用于口渴烦热，痰火咳嗽，痰中带血，胃痛吞酸，胸胁疼痛，瘰疬等症。

青蛤（青蛤蜊）

Cyclina sinensis Gmelin

【识别特征】帘蛤科。贝壳（清蛤壳）2片，坚硬，近圆形，背缘略呈三角形，腹缘略呈圆弧形。壳顶突出，同心纹突出壳面，略呈环肋状，壳面青灰色或黄白色，腹缘部灰白色或淡红色。壳内面白色。铰合部左右两壳均具主齿3个，无侧齿。

【分布生境】我国大部分沿海地区。

【药用功效】同文蛤。

淡菜（红蛤、贻贝、海蛏）

Mytilus crassitesta Lischke

【识别特征】贻贝科。贝壳2片，呈楔形。壳顶尖小，腹缘略直，背缘与腹缘呈30度角向后方延伸，背缘呈弧形。壳后缘圆。生长纹明显。壳表面黑棕色，壳顶端色浅。壳内面灰蓝色，具珍珠光泽。前闭壳肌痕小，位于壳顶内方；后闭壳肌痕大，卵圆形，位于后端背缘。壳顶内面具2个小主齿。外壳缘具分叉状的触手；足后端成片状，前端呈棒状，淡黄色。

【分布生境】我国黄海、渤海、东海等地。生浅海礁石上。

【药用功效】贝肉鲜用或干用，全年可捕捞。性味咸，温。补肝肾、益精血。用于虚劳羸瘦，眩晕，盗汗，阳痿，腰痛，吐血，崩漏，带下等症。

乌贼科

海螵蛸（乌鱼骨、墨鱼盖）

【识别特征】为金乌贼的内壳。金乌贼（*Sepia esculenta* Hoyle）体长椭圆形，胴体卵圆形，长约为宽的1.5倍。胴体两侧肉鳍边窄，后端不相连。头前端触腕的长短相近，各腕的吸盘大小相近。体内有一个贮存墨汁的黑囊。体背中央有一个长椭圆形浅黄白色石灰质的骨骼，其后端有骨针。生活时体黄褐色，雌性背部有紫棕色细斑与白斑相间；雄性背部有波状条纹。

【分布生境】主要分布黄海、渤海、东海一带。

【药用功效】干燥骨状内壳（海螵蛸）入药，全年捕捞。性味咸，微温。除湿、制酸、止血、敛疮。用于胃痛吞酸，吐血，便血，遗精，滑精，赤白带下等症。同科动物无针乌贼*Sepiella maindroni* de Rochebrune的干燥骨状内壳同等入药。

刺海马（海马、海狗子、水马）

Hippocampus histrix Kaup

【识别特征】海龙科。体扁长形而弯曲，鲜时黄白色，干后褐黄色。头冠略高，前方具1个管状长吻，口小，无牙，眼较大。头部及体上各环节间的棘细而尖。尾部渐细卷曲。

【分布生境】华南沿海等地。

【药用功效】干燥全体入药，夏、秋季捕捞。性味甘，温。补肾壮阳、散结消肿。用于阳痿，遗尿，虚喘，疔疮肿毒，跌打损伤等症。同科动物大海马、斑海马、日本海马同等入药。

线纹海马（海马、克氏海马）

Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder

【识别特征】海龙科。体扁长形而弯曲，鲜时黄白色。头冠低，前方具1个管状长吻，口小，无牙，眼较大。头部及体上各环节间棘短钝呈小突起状。尾部渐细卷曲。

【分布生境】华南沿海等地。

【药用功效】同刺海马。

海龙（尖海龙、杨枝鱼、钱串子）

Syngnathus acus Linnaeus.

【识别特征】海龙科。体细长条形，宽度和高度近相等，鲜时黄绿色，腹侧淡黄色，干燥体灰褐色。头长而细尖，吻长超过全头长的1/2，眼睛较大。躯干部七棱形，尾部四棱形，尾后方渐细，不卷曲。背鳍较长；臀鳍短小；胸鳍扇形，位低；尾鳍后缘圆形，黑褐色。体黄绿色，腹部淡黄色；体上具多数不规则暗色横带。

【分布生境】我国渤海、黄海、东海、南海的近陆海域。

【药用功效】干燥体入药，全年可捕捞。性味甘，温。补肾壮阳、散结消肿。用于阳痿，遗精，跌打损伤，瘰疬等症。同科动物刁海龙*Solenognathus hardwickii* (Gray)；拟海龙*Syngnathoides biaculeatus* (Bloch) 同等入药。

中文名称索引

A

艾蒿 / 144

B

白扁豆 / 065
白茅 / 159
白皮松 / 018
白芷 / 105
板蓝根 / 051
半夏 / 162
背角无齿蚌 / 212
蓖麻 / 082
鳖甲 / 209
冰糖草 / 132
薄荷 / 123

C

苍耳 / 153
草乌 / 046
侧柏 / 020
柴胡 / 103
长春花 / 108
车前 / 134
穿山龙 / 179
垂盆草 / 053
刺海马 / 220
刺五加 / 100

D

大麻 / 022
大枣 / 085
丹参 / 126
淡菜 / 218
党参 / 141
地肤 / 031
地黄 / 131
吊竹梅 / 166
鼎突多刺蚁 / 196
冬虫夏草 / 193
冬瓜 / 138
东亚飞蝗 / 187
东亚钳蝎 / 199
杜仲 / 057

E

耳草 / 135

F

防风 / 104
飞扬草 / 080

G

栝楼 / 140
甘草 / 066
甘野菊 / 154
杠板归 / 028
鸽子 / 205
葛 / 071
蛤蚧 / 207
枸杞 / 130
构树 / 024
龟 / 208
鬼针草 / 148

H

海红薯 / 110
海金沙 / 004
海龙 / 222
海螵蛸 / 219
海芋 / 164
何首乌 / 029
红花 / 155
红升麻 / 056
红玉帘 / 177
胡卢巴 / 069
槲蕨 / 011
虎耳草 / 055
花椒 / 075
槐 / 073
槐叶苹 / 014
黄芩 / 118
黄花列当 / 113
黄精 / 167
活血丹 / 121
藿香 / 119

J

鸡冠花 / 034
鸡内金 / 204
鸡头米 / 042
蒺藜 / 074
家蚕 / 191
荚果蕨 / 008
假马鞭草 / 116
桔梗 / 143
节节草 / 002
金莲花 / 045
金纽扣 / 151
金荞麦 / 030
金腰箭 / 150
金银花 / 137

九香虫 / 197
韭菜 / 172
橘皮 / 076
卷丹 / 169
蕨 / 006
决明 / 068
K
苦瓜 / 139
苦参 / 072
昆布 / 185
阔叶十大功劳 / 047
L
莲 / 041
连翘 / 106
裂叶荆芥 / 120
灵芝 / 184
龙葵 / 127
蝼蛄 / 190
芦苇 / 158
鹿茸 / 201
罗布麻 / 109
罗勒 / 124
螺蛳 / 211
葎叶蛇葡萄 / 088
M
麻雀 / 206
马鞭草 / 115
马齿苋 / 037
马兜铃 / 026
马兰 / 149
马蔺 / 182
马缨丹 / 114
满江红 / 015
芒萁 / 005
毛泡桐 / 133
玫瑰花 / 062
蜜蜂 / 194
膜荚黄芪 / 070
牡丹 / 044
牡荆 / 117
牡蛎 / 214
木芙蓉 / 094
木槿 / 093
N
鸟巢蕨 / 009
牛蒡 / 146
牛膝 / 036
P
爬山虎 / 089
蒲公英 / 152
Q
千日红 / 035
牵牛 / 111
茜草 / 136
秦艽 / 107
青蛤 / 217
青葙 / 033
苘麻 / 091
瞿麦 / 039
拳参 / 027
R
人参 / 101
S
三七 / 102
三叶鬼针草 / 147
桑 / 023
沙棘 / 097
山丹 / 170
山楂 / 060
芍药 / 043
射干 / 180
肾蕨 / 010
石决明 / 213
石榴 / 098
石蒜 / 176
石竹 / 040
薯蓣 / 178
四叶苹 / 013
苏铁 / 016
酸枣 / 084
T
桃仁 / 058
天麻 / 183
天仙子 / 128
贴梗海棠 / 061
铁海棠 / 083
铁苋菜 / 081
葶苈子 / 052
土鳖 / 198
土荆芥 / 032
土木香 / 156
土人参 / 038
菟丝子 / 112
W
瓦楞子 / 215
瓦松 / 054
望江南 / 067
文蛤 / 216
乌骨鸡 / 203

乌敛莓 / 087
无花果 / 025
梧桐 / 095
蜈蚣 / 200
五味子 / 050
X
西伯利亚远志 / 078
蟋蟀 / 189
仙鹤草 / 064
仙人掌 / 096
线纹海马 / 221
香附子 / 161
薤白 / 173
辛夷 / 049
猩猩草 / 079
杏仁 / 059
熊 / 202
萱草 / 174
Y
鸭跖草 / 165
沿阶草 / 175
洋金花 / 129
羊乳 / 142
野慈姑 / 157
野牡丹 / 099
野西瓜苗 / 090
益母草 / 122
薏苡 / 160
茵陈蒿 / 145
银粉背蕨 / 007
银杏 / 017
油松 / 019
有柄石韦 / 012
鱼腥草 / 021
玉兰 / 048
玉竹 / 168
鸢尾 / 181
远志 / 077
月季 / 063
Z
蚱蝉 / 192
掌叶半夏 / 163
知母 / 171
枳椇 / 086
中华蟾蜍 / 210
中华稻蝗 / 188
朱槿 / 092
紫苏 / 125

拉丁文名称索引

A

Abutilon theophrasti Medic. / 091
Acalypha anstralis L. / 081
Acanthopanax senticosus (Rupr. et Maxim.) Harms / 100
Achyranthes bidentata Bl. / 036
Aconitum kusnezoffii Reichb. / 046
Agastache rugosa (Fisch.et Mey.) O. Ktze. / 119
Agrimonia pilosa Ledeb. / 064
Aleuritopteris argenter (Gmel.) Fée Gen. Fil. / 007
Allium macrostemon Bge. / 173
Allium tuberosum Rottl. / 172
Alocasia macrorrhiza (L.) Schott / 164
Ampelopsis humulifolia Bge. / 088
Anemarrhena asphodeloides Bge. / 171
Angelica dahurica (Fisch.)Benth / 105
Anodonta woodiana Lea / 212
Apis cerana Fabricius / 194
Apocynum venetum L. / 109
Arca subcrenata Lischke / 215
Arctium lappa L. / 146
Aristolochia contorta Bge. / 026
Artemisia argyi Levl.et Vant. / 144
Artemisia capillaris Thunb. / 145
Aspongopus chinensis Dallas / 197
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et. Sav. / 056
Astragalus membranaceus (Fisch.)Bge. / 070
Azolla imbricata (Roxb.) Nakai / 015

B

Belamcanda chinensis (L.) DC. / 180
Bellamya quadrata (Benson) / 211
Benincasa hispida (Thunb.)Cogn. / 138
Bidens bipinnata L. / 148
Bidens pilosa L. / 147
Bombyx mori Linnaeus. / 191
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. / 024
Bufo bufo gargarizans Cantor / 210
Bupleurum chinense DC. / 103
Buthus martensii Karsch / 199

C

Cannabis sativa L. / 022
Carthamus tinctorius L. / 155
Cassia obtusifolia L. / 068
Cassia occidentalis L. / 067
Catharanthus roseus (L.)G.Don / 108
Cayratia japonica (Thunb.)Gagnep. / 087
Celosia argentea L. / 033
Celosia cristata L. / 034
Cervus nippon Temminck / 201
Chaenomeles speciosa (Sweet) Naka / 061
Chenopodium ambrosioides L. / 032
Chinemys reevesii (Gray) / 208
Citrus reticulata Blanco Fl. / 076
Codonopsis lanceolata (S.et Z.)Trautv. / 142
Codonopsis pilosula(Franch.) Nannf. / 141
Coix lacryma-jobi L.*var.ma-yuen* (Roman.) Stapf / 160
Columba livia domestica Gmelin / 205
Commelina communis L. / 165
Crataegus pinnatifida Bge. / 060
Cryptotympana atrata (Fabricius) / 192
Cuscuta chinensis Lam. / 112
Cycas revolute Thunb. / 016
Cyclina sinensis Gmelin / 217
Cyperus rotundus L. / 161

D

Datura metel L. / 129
Dendranthema lavandulifolium var. *seticuspe* (Maxin.) Shih / 154

Dianthus chinensis L. / 040
Dianthus superbus L. / 039
Dicranopteris dichotoma (Thunb.) Bernh. / 005
Dioscorea nipponica Makino / 179
Dioscorea opposita Thunb. / 178
Dolichos lablab L. / 065
Drynaria fortunei (Kze.) J. Sm. / 011

E

Equisetum ramosissimum Desf. / 002
Eucommia ulmoides Oliv. / 057
Euphorbia heterophylla L. / 079
Euphorbia hirta L. / 080
Euphorbia milii Desmul.ex Boiss. / 083
Eupolyphaga sinensis Walker / 198
Euryale ferox Salisb. / 042

F

Fagopyum dibotrys (D.Don) Hara / 030
Ficus carica L. / 025
Firmiana simplex (L.) Wright / 095
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. / 106

G

Gallus gallus domesticus Brisson / 203
Ganoderma lucidum (Leyss.ex Fr.) Karst. / 184
Gastrodia elata Bl. / 183
Gekko gecko Linnaeus / 207
Gentiana macrophylla Pall. / 107
Ginkgo biloba L. / 017
Glechoma longtuba (Nakai) Kupr. / 121
Glycyrrhiza uralensis Fisch. / 066
Gomphrena globosa L. / 035
Gryllotalpa 0rientalis Burmeister / 190

H

Haliotis gigantea discus Reeve / 213
Hemerocallis fulva L. / 174
Hepilus armoricanus Oberthür. / 193
Hibiscus mutabilis L. / 094
Hibiscus rosea-sinensis L. / 092
Hibiscus syriacus L. / 093
Hibiscus trionum L. / 090
Hippocampus histrix Kaup / 220
Hippocampus kelloggi Jordan et Snyder / 221
Hippophae rhamnoides L. / 097
Houttuynia cordata Thunb. / 021
Hovenia dulcis Thunb. / 086
Hyoscyamus niger L. / 128

I

Imperata cylindrica (L.)Beauv.*var.major* (Nees) C.E. Hubb. / 159
Inula helenium L. / 156
Ipomoea pes-caprae(L.) Sweet / 110
Iris lactea Pall.var.*chinensis* (Fisch.) Koidz. / 182
Iris tectorum Maxim. / 181
Isatis tinctoria L. / 051

K

Kalimeris indica (L.) Sch.-Bip. / 149
Kochia scoparia (L.) Schrad. / 031

L

Laminaria japonica Aresch. / 185
Lantana camara L. / 114
Leonurus japonicus Houtt. / 122
Lepidium apetalum Willd. / 052
Lilium lancifolium Thunb. / 169
Lilium pumilum DC. / 170
Locusta migratoria manilensis (Mey.) / 187
Lonicera japonica Thunb. / 137
Lycium chinense Mill. / 130
Lycoris radiata (L Herit.) Herb / 176
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. / 004

M

Magnolia denudata Desr. / 048
Magnolia liliflora Desr. / 049
Mahonia bealei (Fort.) Carr. / 047

Marsilea quadrifolia L. / 013
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro / 008
Melastoma camdidum D.Don / 099
Mentha haplocalyx Briq. / 123
Meretrix meretrix Linnaeus / 216
Momordica charantia L. / 139
Morus alba L. / 023
Mytilus crassitesta Lischke / 218
N
Nelumbo nucifera Gaertn. / 041
Neottopteris nidus (L.) J.Sm. / 009
Nephrolepis auriculata (Linn.) Trimen / 010
O
Ocimum basilicum L. / 124
Oldenlandia auricularia (L.) F.-Muell. / 135
Ophiopogon bodinieri Levl. / 175
Opuntia dillenii (Ker.-Gaw.) Haw. / 096
Orobanche pycnostachya Hance / 113
Orostachys fimbriatus (Turcz.) Berger / 054
Ostrea rivularis Gould / 214
Oxya chinensis (Thunb.) / 188
P
Paeonia lactiflora Pall. / 043
Paeonia suffruticosa Andr. / 044
Panax ginseng C. A Mey / 101
Panax pseudo-ginseng Wall.var.*notoginseng* (Burkill) Hoo & Tseng / 102
Parthenocissus tricuspidata (Sieb.et Zucc.)Planch. */ 089*
Passer montanus saturatus Stejneger / 206
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. / 133
Perilla frutescens (L.) Britt. / 125
Pharbitis hederacea (L.) Choisy / 111
Phragmites australis (Cav.) Trin. / 158
Pinellia pedatisecta Schott / 163
Pinellia ternata (Thunb.)Breit. / 162
Pinus bungeana Zucc. / 018
Pinus tabulaeformis Carr. / 019
Plantago asiatica L. / 134
Platycladus orientalis(L.) / 020
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. / 143
Polgyala sibirica L. / 078
Polgyala tenuifolia Willd. */ 077*
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce / 168
Polygonatum sibiricum Delar. ex Redoute / 167
Polygonum bistorta L. / 027
Polygonum muliflorum Thunb. / 029
Polygonum perfoliatum L. / 028
Polyrhachis vicina Roger / 196
Portulaca oleracea L. / 037
Prunus armeniaca L. / 059
Prunus persica Batsch. / 058
Psidium guajve L. / 098
Pteridium aquilinum (L.) kuhu ver. *latiusculum* (Desv.) Underw. / 006
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi / 071
Pyrrosia petiolosa (Christ) Ching / 012
R
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) Libosch. / 131
Ricinus communis L. / 082
Rosa chinensis Jacq. / 063
Rosa rugosa Thunb. / 062
Rubia cordifolia L. / 136
S
Sagittaria trifolia L. / 157
Salvia miltiorrhiza Bge. / 126
Salvinia natans (L.) All. / 014
Saposhnikovis divaricata (Turcz.) Schischk. / 104
Saxifraga stolonifera Merrb. / 055
Scapsipedus micado Saussure / 189
Schisandra chinensis (Turcz.)Baill. / 050
Schizonepeta tenuifolia (Benth.) Briq. / 120
Scolopendra subspinipes mutilans L. Koch / 200
Scoparia dulcis L. / 132

Scutellaria baicalensis Georgi / 118
Sedum sarmentosum Bge. / 053
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spr. / 003
Selenarctos thibetanus G.Cuvier / 202
Sepia esculenta Hoyle / 219
Solanum nigrum L. / 127
Sophora flavescens Ait. / 072
Sophora japonica L. / 073
Spilanthes paniculata Wall. ex DC. / 151
Stachytarpheta jamaicensis (L.)Vahl. / 116
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. / 150
Syngnathus acus Linnaeus. / 222

T

Talinum paniculatum (Jacq) Gaertn. / 038
Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. / 152
Teigonella foenum_graecum L. / 069
Tribulus terrestris L. / 074
Trichosanthes kirilowii Maxim. / 140
Trionyx sinensis Wiegmann / 209
Trollius chinensis Bge. / 045

V

Verbena officinalis L. / 115
Vitex negundo L.var.*cannabifolia*(Sieb. Zucc.) Hand.-Mazz. / 117

X

Xanthium sibiricum Patrin / 153

Z

Zanthoxylum bungeanum Maxim. / 075
Zebrina pendula Schnizl. / 166
Zephyranthes grandiflora Lindl. / 177
Ziziphus jujuba Mill. / 085
Ziziphus jujuba Mill.var.*spinosa* (Bge.) Hu ex H.f.Chow / 084

参考文献

[1] 徐辉光．常用中药知识[M]．上海科学技术出版社，1965.

[2] 广州部队后勤部卫生部．常见中草药手册[M]．北京：人民卫生出版社，1969.

[3] 中国科学院植物研究所．中国高等植物图鉴1—5册[M]．北京：科学出版社，1972.

[4] 江苏新医学院．中药大辞典上下册[M]．上海科学技术出版社，1986.

[5] 徐国钧，王强．中草药彩色图谱[M]．福建科学出版社，2006.

[6] 张国斌．本草纲目彩图药典1—4卷[M]．天津科技翻译出版公司，2007.

[7] 易蔚，黄克南．400种中草药野外识别图鉴[M]．北京：化学工业出版社，2010.